

# Estarzate Plus

Firma registrante:  
La Forja S.A.  
Ruta Nacional 101,  
km 24,500,  
Canelones Uruguay,  
Tel.: 598 2 683 8815  
www.tafirel.com

CONTENIDO NETO 5 LTR  
Fecha de Vto.: 12/2016  
Fabricación extranjera.

DGSSAA REG N° 3666

**Axoxystrobin 200 gr/lt - Tebuconazole 150 gr/lt**  
**Fungicida - Suspensión Concentrada**



**TAFIREL**  
COMPAÑIA DE AGROQUIMICOS

## Grupo químico a que pertenece el ingrediente activo:

Axoxystrobin: Metoxiacrylate, Tebuconazole: Triazol

**Instrucciones de almacenamiento:** Guardar el producto en su envase original, etiquetado, bien cerrado, en lugar fresco, ventilado, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar aislado de los recintos usados como vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas, raciones, fertilizantes, u otros similares. Debe estar claramente señalizado con un cartel que indique "Cuidado-veneno (catavera)".

**Generalidades, modo de acción sobre la plaga o el cultivo:** El tebuconazol actúa afectando la membrana de los hongos patógenos inhibiendo la producción de ergosterol y el Axoxystrobin tiene acción oligostémica, alterando los procesos respiratorios en las mitocondrias de los hongos.

Cultivo	Plaga		Dosis (cc/ha)
	Nombre Común	Nombre Científico	
Arroz	Podredumbre del tallo	Sclerotium oryzae	300 a 400
	Brusone	Pyricularia grisea	
Trigo	Golpe blanco	Fusarium graminearum	
Soja	Roya	Phakopsora pachyrhizi	

**Momento(s) de aplicación para cada combinación:** Aplicar cuando aparezcan los primeros síntomas o en forma preventiva desde la emergencia de las panojas.

**Compatibilidad y fototoxicidad:** En general es compatible con los productos de reacción neutra usados en arroz, soja y trigo. En caso de mezclar con otros productos y desconocer o tener dudas sobre el comportamiento físico, o sobre la efectividad agronómica o sobre la fitotoxicidad de la mezcla, realizar una prueba a pequeña escala antes de su aplicación en todo el cultivo.

**Tiempo de espera:** Tiempo de espera: Arroz y Trigo 30 días. Soja 21 días.

**Tiempo de ingreso al cultivo:** No ingresar al área tratada hasta que la pulverización haya secado completamente dejando transcurrir como mínimo 24 horas.

**Modo de preparación y técnica de aplicación:** Llenar con agua limpia el tanque de la máquina pulverizadora hasta la mitad de su capacidad con el agitador en marcha o retorno en marcha. Agregar la dosis a emplear de ESTARZATE PLUS. Completar el llenado del tanque con la cantidad de agua necesaria. La pulverización debe realizarse con un tamaño de gota pequeño, para cubrir mejor la superficie tratada. Puede ser aplicado con equipos terrestre o aéreo. No realizar aplicaciones aéreas a una distancia inferior a

500 metros de cualquier zona urbana o suburbana y centro poblado. No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos de arroz a una distancia inferior a 300 metros de cualquier zona urbana o suburbana y centro poblado. **Antídotos:** No tiene antídoto. Realice tratamientos sintomáticos. En caso de intoxicación llamar inmediatamente al médico.

**Primeros auxilios:** En caso de contacto con la piel lavado de las partes afectadas con abundante agua o agua y jabón. Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de usarlas. En caso de contacto ocular lavado con abundante agua limpia durante 15 minutos manteniendo los párpados separados. En caso de inhalación retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarlo a un lugar bien ventilado. En todos los casos consultar al médico llevando el envase y/o la etiqueta del producto.

**Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros, instrucciones de almacenamiento y manejo de envases:** Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos. No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. No pulverizar contra el viento. Evitar la deriva. Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto. Lavor cuidadosamente los elementos empleados con el producto. Lavar el equipo protector luego de cada aplicación. No lavar los equipos de aplicación en lagos, ríos u otras fuentes de agua. No destapar los picos de la pulverizadora con la boca. No contaminar lagos, ríos u otra fuente de agua o corrientes de agua con restos del producto. **Equipos de protección personal a utilizar durante la preparación y aplicación del producto:** Utilizar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. **Disposición final de envases:** Una vez vaciado el contenido del envase haga el "Triple lavado" del mismo volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora. Luego perfome el envase para evitar su reutilización como tal. **Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos y peces, aves y abejas:** Toxicidad para abejas y aves; Ligeramente tóxico. Toxicidad para peces; Moderadamente tóxico. **MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS. EN CASO DE INTOXICACION LLAMAR AL CIAT TEL: (02) 1722. CONCURRIR AL MÉDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE. NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS. NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACION EN LAGOS RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.** Producto autorizado por el MGAP USO AGRÍCOLA. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

**Nota:** LA FORJA S.A. garantiza la calidad de este producto. Dado sin embargo que su almacenaje, manejo y aplicación se realizan fuera de su control y en condiciones de medio variable, ésta no se hace responsable por los daños y perjuicios que pudieran derivarse del empleo de este producto siguiendo o no las instrucciones de uso.



Clase III. Producto poco peligroso  
IPCS/OMS/2004.

