

Tecamin Max



BIONUTRIENTE DE ALTA CONCENTRACIÓN DE L-AMINOÁCIDOS DE ORIGEN VEGETAL

RIQUEZAS GARANTIZADAS

Aminoácidos Totales	14,4 % p/p
Aminoácidos Libres "L"	12 % p/p
Nitrógeno Total (N)	7 % p/p

- ✓ Activa el crecimiento y desarrollo del cultivo
- ✓ Recuperación de la planta en situaciones de estrés
- ✓ Acción "carrier" o transportadora

Se aconseja TECAMIN MAX durante todo el ciclo vegetativo, con suficiente área foliar receptiva desde trasplante, desarrollo vegetativo, brotación, floración y desarrollo de los órganos vegetales a recolectar, así como para superar diversas situaciones de estrés.

MODO DE EMPLEO

Aplicación Foliar al 0,15%-0,3% (150 -300 c.c. / 100 L de agua o caldo).

CULTIVO	MOMENTO DE APLICACIÓN	L/Ha
Berries (Zarzamora, mora, frambuesa, arándanos)	- Desde inicio entrada en producción hasta fin de cultivo, cada 7-10 días.	2-3
Cítricos - Frutales (naranja, mandarino, lima, limón, pomelo, manzano, peral, melocotón, cerezo, albaricoque, ciruelo, olivo ...)	- En brotación realizar 1-2 aplicaciones y al desarrollo del fruto.	3
Hortalizas (cebolla, ajo, patata, zanahoria, lechuga, espinacas, acelgas, escarolas, apio, coliflor, brócoli, ...)	- Aplicar para recuperación de situaciones de estrés.	2-3
Hortalizas – Frutos - Semillas (Tomate, pimiento, pepino, calabaza, guisantes, judía, ...)	- Aplicaciones desde inicio desarrollo hasta fin de cultivo, cada 7-10 días.	1,5-2
Hortalizas – Frutos (Melón – Sandía)	- Aplicar 1-2 tratamientos en desarrollo vegetativo, en prefloración para estimular la floración y al desarrollo del fruto.	2-3
Hortalizas – Frutos (Fresa – Fresón- Frutilla)	- Desde inicio entrada en producción hasta fin de cultivo, cada 7-10 días.	2-3
Ornamentales, flores	- Desde crecimiento hasta corte, realizar aplicaciones cada 7-10 días.	2-3
Pasturas – Forrajes (Alfalfa, Trébol)	- Aplicar a los 10-15 días después de cada corte o pastoreo.	1-2
Soja – Maíz – Sorgo	- Aplicar cuando hay de 5 a 8 hojas, etapa de crecimiento vegetativo. - Aplicar al inicio de floración.	1-2
Trigo – Cebada – Avena	- Aplicar cuando hay de 4 a 5 hojas, etapa de macollaje. - Aplicar al embuchado para mejorar la calidad del grano. - Aplicar junto herbicidas para superar estrés.	1-2
Vid, uva de mesa	- En yema algodonosa y a brote de 10 cm (uniformar brotación) y al desarrollo del fruto.	2-3

Aplicación Vía Riego

Aplicar de 15-40 L/Ha, durante todo el ciclo vegetativo para estimular el sistema radicular, repartir la dosis en 4-8 aplicaciones de 3-5 L/ha. Cultivo Hidropónico 1 L/Ha y tratamiento.

Registro MGAP N° 429/013