

Tecamin

Raiz



BIONUTRIENTE RADICULAR A BASE DE AMINOÁCIDOS Y MICROELEMENTOS

RIQUEZAS GARANTIZADAS

| | |
|----------------------------------|------------|
| Aminoácidos Libres "L" | 4,7 % p/p |
| Nitrógeno Total (N) | 5,5 % p/p |
| Potasio Total (K ₂ O) | 1 % p/p |
| Materia Orgánica Total | 22 % p/p |
| Hierro (Fe) | 0,5 % p/p |
| Manganeso (Mn) | 0,3 % p/p |
| Zinc (Zn) | 0,15 % p/p |
| Cobre (Cu) | 0,05 % p/p |
| Boro (B) | 0,05 % p/p |
| pH | 4 |

- ✓ Elevado poder enraizante
- ✓ Aumenta % germinación. Uniformidad en el desarrollo vegetativo
- ✓ Estimula el desarrollo de pelos radiculares absorbentes
- ✓ Favorece una rápida recuperación post-trasplante
- ✓ Aporte de microelementos

TECAMIN RAIZ se incorporará en la zona de influencia de las raíces mediante riego por goteo, aspersión, micro-aspersión, inmersión, inyección o aplicación en banda de plantación mediante bomba de espalda o equipo de fumigación que asegure la incorporación del producto a la zona de influencia radicular.

Se aconseja aplicar cuando sea necesario favorecer el desarrollo radicular, semillero, vivero o almácigo o periodo crítico del trasplante y en plantaciones establecidas después de un periodo de daños del sistema radicular por encharcamiento, sequía, sales, enfermedad, plagas ...

MODO DE EMPLEO

| CULTIVO | MOMENTO DE APLICACIÓN | L/Ha |
|--|--|--|
| Cítricos – Frutales (naranja, mandarina, lima, limón, pomelo, manzano, peral, melocotón, cerezo, albaricoque, ciruelo, olivo guayaba, ...) | - Incorporar con el riego a los 3-4 días de la siembra ó repique, aplicar cada 7 días, durante su estancia en semillero, vivero o almácigo. - En el trasplante - Con el primer riego en plantación definitiva | 2-3 c.c./l 6-8 c.c./árbol 3-4 l/Ha |
| Hortícola (cebolla, ajo, patata, zanahoria, lechuga, espinacas, acelgas, escarolas, apio, coliflor, brócoli, tomate, pimiento, pepino, calabaza, guisantes, judías, melón, sandía, frutilla, fresa, fresón, espárrago, berries, ...) | - Incorporar con el riego a los 3-5 días de la germinación, aplicar cada 7 días. Aplicar la dosis total dividida en 3-4 aplicaciones para las plantas que suponen una hectárea. - En el trasplante, riego o inmersión de las bandejas. Se puede combinar con cualquier insecticida, fungicida. - Con el primer riego en plantación definitiva. | Dosis total para las plantas que suponen 1 hectárea: a) Primavera-Verano: 0,5-0,75 L/Ha b) Otoño-Invierno: 1 L/Ha 10 c.c./l 3 l/Ha |
| Ornamentales, flores | - Incorporar con el riego a los 3-4 días de la siembra ó repique, aplicar cada 7 días. - En el trasplante, riego o inmersión de las bandejas o macetas. Se puede combinar con cualquier insecticida, fungicida. - Después de cada corte. | 2-3 c.c./l 5 c.c./l 3 l/Ha |
| Tabaco | - Aplicación por riego ó inmersión al trasplante. | 10 c.c./l |
| Vid, uva de mesa | Desde siembra injerto en maceta o campo, cada 15-21 días, hasta agostamiento. | 2-3 c.c./l ó 3 l/Ha |

Registro MGAP N° 429/014

 TAFIREL

Distribuidor:
La Forja S.A. Ruta 101, km 24,500, Canelones. Uruguay.
Código Postal: 91001 - Tel.: 598 26838815 - Fax: 598 26838626
www.tafirel.com - tafirel@tafirel.com

Fabricante:
Pol. Ind. La Cava 1 - Avd. Diputación N° 4 - 46892 Montaverner
(Valencia) Tel: +34 963 391 184 / Fax: +34 963 269 823
info@agritecnofertilizantes.com - www.agritecnofertilizantes.com

PRESENTACIÓN: LÍQUIDA
MÉTODO DE APLICACIÓN: RADICULAR

 AgriTecno
Fertilizantes