

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS. NO LO TRANSPORTE NI ALMACENE CON ALIMENTOS. INUTILICE Y ELIMINE ADECUADAMENTE LOS ENVASES VACÍOS. EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O ENVASE AL MÉDICO. NO LAVE LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y DEMÁS FUENTES DE AGUA. PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESPECIFICADOS EN LA ETIQUETA. USO AGRÍCOLA. LEA ATENTANTEME LA ETIQUETA (Y EL FOLLETO ADJUNTO SI EXISTE) ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

Medidas precautorias: Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos. No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del mismo. No pulverizar contra el viento. No destapar los picos pulverizadores con la boca. Luego de la aplicación lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto. Lavar cuidadosamente todos los elementos empleados con el producto tres veces (Triple Lavado). Lavar el equipo protector luego de cada aplicación.

Clase toxicológica: CLASE III (TRES). LIGERAMENTE PELIGROSO.

Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico.

Toxicidad para peces: Moderadamente tóxico.

Toxicidad para abejas: Virtualmente no tóxico.

Protección del ambiente: No contaminar fuentes o corrientes de agua con resto del producto. No lavar los equipos de aplicación en lagos, ríos u otras fuentes de agua. Tomar las precauciones necesarias y suficientes para que el producto aplicado ni sus compuestos de degradación hagan contacto en aves, en abejas, en organismos acuáticos y/o en peces debido al posible efecto adverso que les pudiera ocasionar, vía oral o por contacto.

Instrucciones de almacenamiento: Guardar el producto en su envase original etiquetado, bien cerrado, en lugar fresco, ventilado, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar aislado de los recintos usados como vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas, raciones, fertilizantes, u otros similares. Manténgase fuera del alcance de los niños, personas irresponsables y animales. Debe estar claramente señalizado con un cartel que indique “Cuidado-Veneno (Calavera)”.

Instrucciones en caso de accidente: Contáctese al MADES al teléfono (+595) 21615 803/4 interno 240, o al importador a los teléfonos (+595) 21613410 / (+595) 983482808. **Aislar y señalizar inmediatamente el área contaminada.**

En caso de derrame: Usar equipo de protección: Mascarilla, guantes, botas de hule, camisa de manga larga, pantalones largos y gorra. Cubrir con material absorbente, luego barrer, juntar y colocarlo en un contenedor, sellar el contenedor y eliminarlo de manera adecuada. Lavar el área con agua y detergente fuerte. **En caso de incendio:** Para pequeños incendios: Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, polvo químico seco o CO2 (Anhidrido carbónico). Para incendios medianos a grandes: Utilizar espuma resistente al alcohol y agua pulverizada. No usar chorro directo de agua ya que contribuiría a expandir aún más el fuego. Evacuar el local del personal no indispensable. Aislar la zona afectada. Acumular separadamente el agua de extinción contaminada, cubrir con material absorbente y eliminarla.

Destino de los envases utilizados: Al ser sobres no aptos para el Triple Lavado, una vez vacíos deben trasladarse al centro de recolección más cercano para ser tratados en el proceso “Canal Sucio”.

Medidas a tomar como primeros auxilios: En caso de ingestión, NO provocar el vómito. En caso de contacto con la piel, lavar la piel afectada con abundante agua. Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volver a usarla. En caso de contacto con los ojos, lavado a chorro con abundante agua limpia durante 15 minutos manteniendo los párpados separados. En caso de inhalación, retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarla a un lugar bien ventilado. En todos los casos consultar al médico llevando el envase y/o la etiqueta del producto.

Antídoto: No tiene antídoto.

Consulta en caso de intoxicación: Llamar al teléfono (+595) 21 220 418 del Centro Nacional de Toxicología o al importador a los teléfonos (+595) 21 613410 / (+595) 983482808.

Atraplex 90 WDG

HERBICIDA GRÁNULOS DISPERSABLES (WG) GRUPO QUÍMICO: TRIAZINA



TAFIREL

Composición del producto:

ATRAZINA 1-Chloro-3-ethylamino-5-isopropylamino-2,4,6-triazine	90.000 % (p/p)
Inertes c.s.p	10.000 % (p/p)

Fabricante: Zhejiang Zhongshan Chemical Industries Group Limited.

Dirección: Taihu Road, Changxing Zona de Desarrollo Económico, la ciudad de Huzhou, Zhejiang, China.

Teléfono: +86-572-6121387 / 6128118

Origen: República Popular de China

Importador y Registrante: TAFIREL PARAGUAY S.A

Dirección: Av. Aviadores de Chaco 2050, Edificio WTC, Torre 3, Piso 9,

Asunción - Paraguay

Teléfonos: (+595) 21 613410 / (+595) 983482808.

Número de Registro: 5273

Número de Libre Venta: 5046

Número SENAVE: 425

Fecha de Fabricación: 07/04/2026

Fecha de Vencimiento: 07/04/2029

Número de Lote: 2026/ATRAPLEX/070426

CONTENIDO NETO: 10 kg
No es inflamable, corrosivo ni explosivo.
LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

Generalidades: ATRAPLEX 90 WDG es un herbicida a base de atrazina, que controla malezas de hoja ancha y gramíneas, selectivamente en cultivos de maíz, sorgo, y caña de azúcar. Se absorbe por las raíces, y su efectividad está ligada a la humedad presente en el suelo, ya sea por lluvia o irrigación. Su mecanismo de acción consiste en inhibir la fotosíntesis, produciendo clorosis y posterior muerte de las malezas.

Cuadro de instrucciones de uso y dosis:

Cultivo o sitio de aplicación	Malezas		Dosis
	Nombre común	Nombre científico	
MAÍZ	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>	SUELO ARENOSO 0,5 kg/ha
	Yuyo colorado	<i>Amaranthus quitensis</i>	
	Lengua de vaca	<i>Rumex crispus</i>	SUELO ARCILLOSO 0,5 - 1,0 kg/ha
	Rábano	<i>Raphanus raphanistrum</i>	
	Revienta caballo	<i>Solanum sisymbriifolium</i>	
SORGO	Rábano	<i>Raphanus sativus</i>	SUELO ARENOSO 0,5 kg/ha
	Mostacilla	<i>Rapistrum rugosum</i>	
	Nabo	<i>Brassica campestris</i>	SUELO ARCILLOSO 0,5 - 1,5 kg/ha
	Abrojo grande	<i>Xanthium cavanillesii</i>	
	Gramilla de rastrojo	<i>Echinochloa colona</i>	
	Brachiaria	<i>Bracharia platyphylla</i>	SUELO ARENOSO 0,5 kg/ha
	Cepa caballo	<i>Xanthium spinosum</i>	
	Chamico	<i>Datura ferox</i>	SUELO ARCILLOSO 0,5 - 1,0 kg/ha
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>	
	Quinoa	<i>Chenopodium album</i>	
CAÑA DE AZÚCAR	Bolsa de pastor	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	SUELO ARENOSO 0,5 kg/ha
	Enredadera anual	<i>Polygonum convolvulus</i>	
	Llantén	<i>Plantago lanceolata</i>	SUELO ARENOSO 0,5 kg/ha
	Amor seco	<i>Bidens pilosa</i>	
	Pastito de invierno	<i>Poa annua</i>	SUELO ARCILLOSO 0,5 - 1,0 kg/ha
	Pasto blanco	<i>Digitaria sanguinalis</i>	
	Avena guacha	<i>Avena sativa</i>	

Momentos de aplicación: Maíz y sorgo: Se aplica en pre siembra incorporando al suelo, en pre emergencia o post emergencia temprana de las malezas (hasta 3-4 hojas). Caña de azúcar: Se aplica en pre emergencia o post emergencia temprana (hasta 3-4 hojas). Una sola aplicación por ciclo de cultivo.

Observaciones respecto al uso: Para la aplicación en suelos arenosos, éstos deberán tener más de 2% de materia orgánica. Las dosis autorizadas bajan su persistencia en este tipo de suelo, por lo que se aconseja complementar el control de estas malezas, con otros herbicidas post emergentes. Es un compuesto muy lixiviable, requiere suelos que tengan más de 2% de materia orgánica a fin de que sea retenida y degradada por microorganismos del suelo. No aplicar las mayores dosis en suelos arenosos.

Incompatibilidad y fitotoxicidad: Es compatible con otros herbicidas utilizados en pre emergencia y/o post emergencia temprana como ametrina, simazina, alaclor, metolaclor, glifosato. En caso de mezclar con otros productos y desconocer o tener dudas sobre el comportamiento físico, o sobre la efectividad agronómica o sobre la fitotoxicidad de la mezcla, realizar una prueba a pequeña escala antes de su aplicación en todo el cultivo.

Tiempo de espera: Las aplicaciones deberán suspenderse 45 días previos a la cosecha para maíz (grano), sorgo (grano). Para caña de azúcar: 45 días. Para siembra en rotaciones posteriores con cultivos sensibles esperar entre 4-5 meses.

Tiempo de reingreso al cultivo: No ingresar al área tratada hasta que la pulverización haya secado completamente dejando transcurrir como mínimo 24 horas.

Método y técnica de aplicación: ATRAPLEX 90 WDG puede emplearse con equipos aéreos o terrestres. Calibrar la máquina para utilizar 100 a 200 L/ha de agua en aplicaciones terrestres y 50 L de agua en aplicaciones aéreas. Utilizar picos de abanico plano. Llenar el tanque hasta un ¼ con agua limpia, en la pulverizadora previamente limpia. Encender la agitación del equipo. Incorporar la cantidad necesaria de ATRAPLEX 90 WDG directamente desde el envase previamente homogeneizado en el tanque de la pulverizadora. Completar el llenado de la máquina. En caso de agregar aceite o surfactante hacerlo al final con la máquina casi llena y mantener el sistema de agitación funcionando. No efectuar el llenado con agua, de la maquinaria de aplicación, directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, lo cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermedios. No realizar aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centros poblados y centros educativos. No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos (cereales, oleaginosas y forrajeras) a una distancia inferior a 300 metros de cualquier zona urbana o sub urbana, centros poblados y centros educativos. No realizar aplicaciones aéreas en todo tipo de cultivo y a una distancia inferior a 30 metros de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas) o fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares). No realizar aplicaciones terrestres con máquinas autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 metros de cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales.

Nota: TAFIREL PARAGUAY S.A. garantiza el contenido exacto de los ingredientes mencionados en la etiqueta en su envase original y sellado y no otorga garantía de ninguna especie por los resultados derivados del uso y/o manejo de este producto por ser operaciones fuera de su control. El comprador asume la responsabilidad y riesgos derivados del uso y manejo, ya sea que se hagan o no de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta.



CUIDADO

