Clasificación toxicológica:
POCO PELIGROSO EN EL USO NORMAL IPCS/OMS, 2019.

Antídoto: No tiene antídoto. **Primeros auxilios:** En caso de ingestión: no provocar el vómito. Contacto con la piel: quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua. Contacto con los ojos: lavado ocular con abundante agua durante 15 minutos, manteniendo los párpados separados. En caso de inhalación: retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarlo a un lugar bien ventilado. En caso de intoxicación llamar al CIAT, teléfono 1722 y concurrir al médico llevando la etiqueta o el folleto o el envase.

Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros: Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos. No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto. Lavar cuidadosamente los elementos empleados que hayan tenido contacto con el producto.
Equipos de protección personal a utilizar durante la preparación y aplicación del producto: Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Lavar el equipo protector luego de cada aplicación.

Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos y peces, aves y polinizadores, lombrices: Medidas Generales: No lavar ni vaciar equipos de aplicación en lagos, ríos, otras fuentes de agua o en la cercanía de los mismos, ni en áreas de desagues naturales. En caso de derrame durante la aplicación, contener y absorber el producto derramado con un material inerte (arena, aserrín, tierra) y recoger con pala; depositar el material impregnado en recipientes, en un sitio donde no haya peligro de contaminación de fuentes de agua. Llamar a DINACEA, teléfono 29006136 int. 4600. Evitar deriva de polvo de semilla.

Peligrosidad del Formulado/Ingrediente Activo:
TOXICIDAD PARA ORGANISMOS ACUÁTICOS: LIGERAMENTE TÓXICO
TOXICIDAD PARA AVES: PRACTICAMENTE NO TÓXICO
TOXICIDAD PARA POLINIZADORES: ALTAMENTE TÓXICO. Por su modo de uso, el riesgo es aceptable.
TOXICIDAD PARA ORGANISMOS DE SUELO (Lombrices): MODERADAMENTE TOXICO. A las dosis recomendadas, el riesgo es aceptable.

Destino Ambiental: Movilidad intermedia. Moderadamente lixiviable

Disposición final de envases: Una vez vaciado el contenido, en el caso de ENVASES RÍGIDOS (bidones, botellas) haga el "triple lavado" o "lavado a presión" del mismo. Luego perfore el envase en su base para evitar su reutilización como tal. Separe las tapas de los envases para llevar por separado. Trasladar los envases al comercio que se los vendió o centro de acopio más cercano. Por más información contactarse con CAMPOLIMPIO al 29254539 o info@campolimpio.org.uy

Instrucciones de almacenamiento: Guardar el producto en su envase original, bien cerrado, en lugar fresco, ventilado, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar aislado de los recintos usados como vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas, raciones fertilizantes u otros similares. Debe estar claramente señalizado con un cartel que indique "Cuidado- Sustancia tóxica".

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS. EN CASO DE INTOXICACION LLAMAR AL CIAT TEL: 1722. CONCURRIR AL MÉDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE. NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS. NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA. PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESPECIFICADOS EN LA ETIQUETA.

Cinatra 60 FS

CIANTRANILIPROL 48 % P/P - 600 g/L
CURASEMILLA INSECTICIDA
SUSPENSIÓN CONCENTRADA PARA TRATAMIENTO DE SEMILLAS

TAFIREL

Grupo IRAC	28	INSECTICIDA

Grupo químico a que pertenece el ingrediente activo:
Diamida antranilica.

Firma registrante: La Forja S.A
Ruta Nacional 101, Km 24,500
Canelones, Uruguay
Tel.: 598 2 683 8815/ Fax: 598 2 683 8626
www.tafirel.com tafirel@tafirel.com

Empresa Certificada.
ISO 9001:2015
LSQA Nº: 1559/01

Fecha de Vencimiento.: 05/02/2025
Fecha de Fabricación: 05/02/2023
Nº Lote: 05022025
Tiempo de validez del producto: 2 años
Origen: China
Producto autorizado por el MGAP Nº 5486
CONTENIDO NETO: 1Lt

USO AGRICOLA
LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y EL FOLLETO ADJUNTO –si existe-) ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Generalidades, modo de acción sobre la plaga o el cultivo: *CINATRA 60 FS*, es un insecticida sistémico y de contacto para el tratamiento de semillas. Este principio activo es un modulador del receptor de rianodina, debido a su capacidad de imitar la rianodina y activar los receptores de rianodina de insectos. Una vez aplicado como tratamiento de semillas, es rápidamente captado por las raíces y es transportado a través del xilema hacia la parte superior de la planta.
Instrucciones de uso:

Cultivo o sitio de aplicación	PLAGAS		Dosis
	Nombre común	Nombre científico	
MAÍZ *(Zea mays L.)*	Lagarta cogollera Isoca chica Gusano alambre Gorgojo verde	*Spodoptera frugiperda* *Cyclocephala signaticollis* *Conoderus spp.* *Pantomorus viridisquamosus*	80 - 160 cc/100 kg de semillas
SOJA *(Glycine max L.)*	Isoca chica Bicho torito	*Cyclocephala signaticollis* *Diloboderus abderus*	30 - 60 cc/100 kg de semillas
COLZA *(Brassica napus L. var. Napus)*	Lagarta cogollera Lagarta cortadora Lagarta cortadora malefida Lagarta cortadora saucia Bicho torito	*Spodoptera frugiperda* *Agrotis ipsilon* *Agrotis malefida* *Peridroma saucia* *Diloboderus abderus*	500 cc/100 kg de semilla

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS: Es compatible con la inoculación (Bradyrhizobium elkanii cepas U-1301+U-1302) si se sigue las recomendaciones de etiqueta. Se recomienda que el tiempo entre inoculación y siembra no supere los 7 días . **Momento(s) de aplicación:** Previo a la siembra. **Frecuencia, número o espaciamiento de las aplicaciones, si corresponde:** Un solo tratamiento previo a la siembra. **Modo de preparación y técnica de aplicación:** Preparar hasta la mitad del volumen de agua necesaria para la dilución. Agregar luego la cantidad necesaria de CINATRA 60 FS, según la cantidad de semillas a tratar. Mezclar para asegurar una dilución homogénea. Completar con agua hasta el volumen total de dilución. Mantener la agitación durante todo el tiempo de uso. La dilución debe ser usada dentro de las 24 horas luego de preparada. Usar siempre agua limpia. **Compatibilidad y fitotoxicidad:** En caso de mezclar con otros productos y desconocer o tener dudas sobre el comportamiento físico-químico o sobre la fitotoxicidad de la mezcla, realizar una prueba a pequeña escala antes de su aplicación en todo el cultivo en una botella limpia. Para conocer la compatibilidad de los fitosanitarios a agregar al tanque de pulverizar, se debe hacer una prueba a escala en una botella limpia. Hecha la mezcla a escala, se agita y posteriormente se deja en reposo y se analiza a 1, 5, 10 y 30 minutos. Si luego de 1 minuto, la mezcla se corta, no deberá aplicarse. Si el corte está entre los 5 y 10 minutos, con agitación se puede aplicar. Si a los 30 minutos, no se cortó, se considera que la mezcla es estable.**Tiempos de espera:** No corresponde. **Tiempo de reingreso al cultivo:** No corresponde. **Otras informaciones necesarias respecto al uso:** Para obtener una buena protección de las semillas, es indispensable distribuir el producto homogéneamente, asegurando que cada una de ellas quede cubierta adecuadamente. Puede ser aplicado en cualquier equipo de tratamiento continuo o por lote (batch). No aplicar directamente dentro de la sembradora. En el momento de la siembra, se debe calibrar la sembradora con semilla tratada, debido a que la misma fluirá más lentamente. **PREVENCIÓN DE RESISTENCIA:** Se recomienda rotar o combinar con otros ingredientes activos de diferentes mecanismos de acción, para prevenir la ocurrencia de resistencia.

Nota: LA FORJA S.A. garantiza la calidad de este producto. Dado sin embargo que su almacenaje, manejo y aplicación se realizan fuera de su control y en condiciones de medio variable, ésta no se hace responsable por los daños y perjuicios que pudieran derivarse del empleo de este producto siguiendo o no las instrucciones de uso. Fabricante: Shanghai E-Tong Chemical Co., Ltd.

CUIDADO