

Firma registrante:
La Forja S.A.
Ruta Nacional 101,
km 24,500,
Canelones Uruguay,
Tel.: 598 2 683 8815
www.tafirel.com

Empresa Certificada,
ISO 45001:2018
LSQA N°: SST 29416/01

CIPERMETRIN

Cipermetrin - 250 gr/lit

Insecticida - Concentrado emulsionable



TAFIREL

Empresa certificada,
ISO 45001: 2018
LSQA N°: SST 29416/01

Contenido neto: 5 L
Fecha de Vto.: 06/07/2026
N° de lote: 06072026
Origen: India
DGS REG N° 3292

Grupo químico al que pertenece el ingrediente activo: Piretroides. **Instrucciones de almacenamiento:** **PRODUCTO NO INFLAMABLE.** Guardar el producto en su envase original etiquetado, bien cerrado, en lugar fresco, ventilado, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para agrotóxicos y estar aislado de los recintos usados como vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas, raciones, fertilizantes, u otros similares. Debe estar claramente señalizado con un cartel que indique "Químico-veneno (calaverá)". **Generalidades:** **Modo de acción sobre la plaga o el cultivo:** CIPRODIP 25 EC es un insecticida de amplio espectro y alto poder de contacto que actúa sobre las plagas por contacto e ingestión, presentando un buen efecto residual.

Instrucciones de uso:

Cultivo o sitio de aplicación	Plagas	Dosis
Soja (Glycine max L.)	Nombre común	Nombre científico
	Lagarta de las guapurusas	<i>Antraxia gemmatilis</i>
	Lagarta del girasol	<i>Plutella maculipennis</i>
Trigo (Triticum aestivum L.)	Epitotia	<i>Crocosema aporema</i>
	Lagarta de los cereales	<i>Pseudaletia auditata</i>
Maíz (Zea mays L.)	Lagarta cogollera	<i>Spodoptera frugiperda</i>
Durazno (Prunus persica L.) (Batsch)	Gusano del duraznero y membrillo (grosulario)	<i>Grapholitha molesta</i>
Tomate (Solanum lycopersicum L.)	Polilla del tomate	<i>Tuta absoluta</i>

30-40 cc/100 L de agua. Las dosis indicadas se refieren a pulverizaciones de alto volumen o a punto de gota. Se recomiendan volúmenes de 80 a 100 l/ha.

30-40 cc/100 L de agua. Las dosis indicadas se refieren a pulverizaciones de alto volumen o a punto de gota. Se recomiendan volúmenes de 80 a 100 l/ha.

PROHIBIDA SU APLICACIÓN 5 DÍAS ANTES Y DURANTE LA FLORACIÓN EN TOMATE, DURAZNO, SOJA. **Momento de aplicación para cada combinación:** Soja: lagartas: antes de floración o cuando haya más de 15 plagas/ml líneal y más de 20% de daño en hojas. Para Epitotia, antes de floración cuando se observen los primeros brotes afectados. Trigo: cuando la plaga alcance nivel de daño económico. Frutales: hoja caduca: aplicar según la recomendación del sistema de advertencia o captura de trampas de feromona. Tomate: aplicar al observar los primeros daños según el nivel de daño económico. **Número, frecuencia, o espaciado de aplicaciones si corresponde:** Realizar 1 sola aplicación por temporada de cultivo. **Compatibilidad y fitotoxicidad:** No mezclar con productos fuertemente alcalinos. En caso de mezclar con otros productos y desconocer o tener dudas sobre el comportamiento físico, o sobre la efectividad agronómica o sobre la fitotoxicidad de la mezcla, realizar una prueba a pequeña escala antes de su aplicación en todo el cultivo. **Tiempo de espera:** Soja, Maíz, Trigo: 30 días; Duraznero: 25 días; Tomate: 21 días. "En caso de que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia". **Tiempo de reintegro al cultivo:** No ingresar al área tratada hasta que la pulverización haya secado completamente dejando transcurrir como mínimo 24 horas. **Modo de preparación y técnica de aplicación:** Llenar hasta la mitad el tanque con agua limpia de la pulverizadora, ponga el agitador en marcha, agregue la cantidad de CIPRODIP 25 EC, y complete con agua limpia el tanque manteniendo la agitación. No efectuar el llenado con agua de la maquinaria de aplicación directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, lo cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermedios. En aplicación terrestre, debe aplicarse con equipo de barra, con picos de abanico plano. La presión deberá ser 2,1 a 3,2 Kg/cm² (30 a 45 lts/pulgada) y un volumen total por ha de 150-200 l. En aplicación aérea, no superar los 14 m de ancho de faja. El volumen de aspersión no deberá ser inferior a los 15 l/ha. No aplicar con vientos superiores a 10km/h, ni en ausencia total de viento, ni durante las horas de máxima insolación (menor humedad relativa). El promedio de gotas por cm² no deberá ser inferior a 25, con una distribución homogénea. **Restricciones Legales para la Aplicación de Productos Fitosanitarios:** Resolución N° 14/2004 y N° 181 del 20/01/2011: No realizar aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centros poblados y centros educativos. No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos (cereales, oleaginosas y forrajeras) a una distancia inferior a

300 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centros poblados y centros educativos. Resolución N° 129 de 27/2/2008: No realizar aplicaciones aéreas en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 30 metros de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas) o fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares). No realizar aplicaciones terrestres con máquinas autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 metros de cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales. No efectuar el llenado con agua de la maquinaria de aplicación directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, lo cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermedios. **Antídoto:** no tiene antidoto. **Primeros auxilios:** En caso de ingestión: lavar la boca con agua. Contiene solventes orgánicos en porcentaje mayor al 30%. Contacto con los ojos: lavar con abundante agua durante 15 minutos. Contacto con la piel: retirar la ropa contaminada y lavar con agua y jabón. En caso de inhalación: retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarla a un lugar bien ventilado. En caso de intoxicación llamar al CIAT, teléfono 21722 y concurrir al médico llevando la etiqueta o el folleto o el envase. En todos los casos consultar al médico llevando el envase, etiqueta y/o el folleto del producto. **Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican:** manipular y a terceros: Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos. No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. No pulverizar contra el viento, evitar la deriva. No destapar los picos de la pulverizadora con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto. Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto. **Equipos de protección personal a utilizar durante la preparación y aplicación del producto:** Usar guantes, botas, caretas, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. **Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos y peces, aves y abejas:** Medidas generales para la protección del medio ambiente: Usar técnicas de aplicación que disminuyan la deriva (tipos de boquilla, altura de la barra de aplicación, velocidad de aplicación, volumen de aplicación) y evitar aplicaciones en condiciones climáticas que aumenten las posibilidades de la misma. No lavar ni vaciar equipos de pulverización en lagos, ríos, otras fuentes de agua, o en la cercanía de los mismos, ni en áreas de desagües naturales. En caso de derrame durante la aplicación contener y absorber el producto derramado con un material inerte (arena, aserrín, tierra) y recoger con pala, depositar el material impregnado en recipientes, en un sitio donde no haya peligro de contaminación de fuentes de agua. La protección de los polinizadores y en particular de la abeja es necesaria para la producción sostenible de alimentos y en varios cultivos está asociada a mayores cosechas. **Peligrosidad:** Toxicidad para peces/ organismos acuáticos: Altamente tóxico. Aplicaciones foliares: No aplicar el producto en condiciones climáticas que favorezcan la deriva (vientos de levante dentro de las 24 h de aplicación) o deriva del producto. Prohibida la aplicación a una distancia a cuerpos de agua menor a 10 m en aplicaciones terrestres y 30 m en aplicaciones aéreas. Evitar la aplicación en surcos de erosión, desagües o áreas que descargan escorrentía en cuerpos de agua adyacentes. Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico. Toxicidad para abejas: altamente tóxico. Aplicaciones foliares: Para protección de polinizadores no aplicar este producto sobre malezas con flores en el cultivo o áreas adyacentes. Aplicar fuera del período de floración de los cultivos. No hacer deriva hacia cultivos adyacentes o plantas en floración. Aplicar de noche o temprano en la mañana, o cuando las temperaturas son inferiores a 13° evitando las condiciones de inversión térmica. No aplicar en noches cálidas cuando las abejas se agrupan en el exterior de las colmenas. Evitar el uso de insecticidas (agrotóxicos humectantes) durante la floración de cultivos no atractivos. Se aconseja el traslado de las colmenas fuera del área de aplicación por lo menos a cuatro kilómetros del límite tratado y por un tiempo mínimo de treinta días. Dar aviso a los apicultores cercanos antes de las 48 hs de aplicación. En caso de no poder trasladar las colmenas, no realizar aplicaciones en el horario de peoreo de las abejas. Taparlas con apilleras o espuma de goma húmeda durante la aplicación. Toxicidad organismos de suelo (lombrices): ligeramente tóxico. Aplicaciones foliares: Utilizar solo en cultivos con cobertura foliar o en ambientes controlados donde la deriva al suelo sea mínima. **Disposición final de envases:** Una vez vaciado el contenido del envase haga el "Triple Lavado" del mismo volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora. Luego, para el envase para evitar su re-utilización, traslade los envases con triple lavado al centro de recolección más cercano.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, ANIMALES DOMÉSTICOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS. EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLAMAR AL CIAT TELÉFONO: 21722. CONCURRIR AL MÉDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE. NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, UTENSILIOS DOMÉSTICOS O VESTIMENTAS. **NO USAR EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.** **Producto autorizado por el MAGAP. USO AGROICOLA. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y EL FOLLETO ADJUNTO (si existe)) ANTES DE USAR EL PRODUCTO. PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN LA ETIQUETA.** **Nota:** LA FORJA S.A. garantiza la calidad de este producto. Dado sin embargo que su almacenaje, manejo y aplicación no realiza la zona de control y en condiciones de medio variable, esto no se hace responsable por los daños y perjuicios que pudieran derivarse de su uso. Este producto sigue el protocolo de Buenas Prácticas de Laboratorio de Science Limited



CLASE II (DOS). MODERADAMENTE PELIGROSO.
IPCS/OMS, 2019

