

Firma registrante:
La Forja S.A.
Ruta Nacional 101,
km 24,500,
Canelones Uruguay.
Tel.: 598 2 683 8815
www.taifirel.com

Empresa Certificada.
ISO 9001:2015
LSQA N°: 1559/01

500 FS

Metiocarb 500 g/L

Insecticida repelente de pájaros

Suspensión concentrada para el tratamiento de semillas

CONTENIDO NETO 5 L
Fecha de Vto.: 23/08/2025
Número de Lote: 23082025
Origen: China

DGSA REG N° 4884

VENTA EXCLUSIVA BAJO
RECETA PROFESIONAL



TAFIREL

Grupo químico al que pertenece el ingrediente activo: Carbamato, Instrucciones de almacenamiento: Guardar el producto en su envase original, etiquetado, bien cerrado, en lugar fresco, ventilado, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar aislado de los recintos usados como vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas, raciones, fertilizantes u otros similares. Debe estar claramente señalizado con un cartel que indique "Cuidado-Veneno (Calavera)". Generalidades, modo de acción sobre la plaga o el cultivo: METIOX 500 FS es un carbasulfamida indicado como repelente para pájaros, en diversos cultivos extensivos. Su tipo de formulación, diseñada como carbasulfamida, le otorga beneficios en cuanto a su manipulación: Dosificación más exacta y menor exposición por el operario.

Instrucciones de uso y dosis:

Cultivo o sitio de aplicación	Plagas		Dosis	Observaciones
	Nombre común	Nombre científico		
SOJA (Glycine Max) (Protección de plántulas)	Paloma torcaza	Zenaidia auriculata	500 (c/100 kg de semilla)	Utilizar 700 cc de caldo (producto + agua) para curar la semilla.
MAÍZ (Zea mays) (Protección de plántulas)	Paloma torcaza	Zenaidia auriculata	1,000 (c/100 kg de semilla)	Utilizar 1.5 L de caldo (producto + agua) para curar la semilla.
SORGO (Sorghum halepense) (Protección de plántulas)	Paloma torcaza	Zenaidia auriculata	1,000 (c/100 kg de semilla)	Utilizar 1.5 L de caldo (producto + agua) para curar la semilla.

Momento de aplicación: Se aplica sobre la semilla, previo a la siembra. No dejar transcurrir más de dos, tres meses entre curado y siembra. **Número, frecuencia, o espaciamiento de aplicaciones al correspondiente:** Un solo tratamiento previo a la siembra. **Compatibilidad y fitotoxicidad:** METIOX 500 FS es compatible sobre los cultivos mencionados. No dejar transcurrir más de tres meses entre curado y siembra. En caso de mezclar con otros productos y desconocer o tener dudas sobre el comportamiento físico, o sobre la efectividad agronómica o sobre la fitotoxicidad de la mezcla, realizar una prueba a pequeña escala antes de su aplicación en todo el cultivo. **Tiempo de espera:** No corresponde por su modo de uso. **Tiempo de reintegro al cultivo:** No corresponde por su modo de uso. **Modo de preparación y técnica de aplicación:** En soja utilizar recipientes diferentes para el curado y el inoculado. De ser posible dejar transcurrir por lo menos 7 días entre el curado y el inoculado. La semilla debe ser sembrada antes de las 24 horas una vez inoculada. Diluir la dosis de producto formulado recomendada cada 100 kilos de semilla en 0.5 a 1.0 litros de agua. Para cada cultivo se ilustra la dilución necesaria en la tabla de recomendaciones. Pesol, sin de 14/5/2004 y N° 198 de 25/8/2011. No realizar aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centros poblados y centros educativos. No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos (cereales, oleaginosas y forrajeras) a una distancia inferior a 300 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centros poblados y centros educativos. Resol. N° 199 de 27/2/2008. No realizar aplicaciones aéreas en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 30 metros de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas) o fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares). No realizar aplicaciones terrestres con máquinas autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 metros de cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales. No efectuar el llenado con agua de la maquinaria de aplicación directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales,

lo cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermedios. **Antídoto:** Sulfato de atropina al 1 por 1000 (uno por mil). **Primeros auxilios:** En caso de ingestión, provocar el vómito introduciendo dos dedos en la boca hasta tocar la garganta. En caso de contacto con los ojos, lavado a chorro con agua limpia abundante durante al menos 15 minutos, manteniendo los párpados separados. En caso de contacto con la piel, lavado de las partes afectadas con abundante agua o agua y jabón. Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volver a usarla. En caso de inhalación, retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarla a un lugar bien ventilado. En todos los casos consultar al médico llevando el envase y/o la etiqueta del producto. En caso de intoxicación, llamar al CIAT Teléfono 21722 y concurrir al médico llevando la etiqueta, el folleto o el envase. **EL PRODUCTO DEBE IR ACOMPAÑADO DE CARTILLA PARA MÉDICOS. Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros:** Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos. No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. No destapar los picos de la pulverizadora con la boca. Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto. Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto. Lavar el equipo protector luego de cada aplicación. No lavar los equipos de aplicación en lagos, ríos u otros fuentes de agua. No contaminar lagos, ríos u otras fuente de agua o corrientes de agua con residuos del producto. **Equipos de protección personal a utilizar durante la preparación y aplicación del producto:** Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. **Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos y peces, aves y abejas:** Medidas generales para protección del medio ambiente: Usar técnicas de aplicación que disminuyan la deriva (tipos de boquilla, altura de la barra de aplicación, velocidad de aplicación, volumen de aplicación) y evitar aplicaciones en condiciones climáticas que aumenten las posibilidades de la misma. No lavar ni vaciar equipos de pulverización en lagos, ríos, otras fuentes de agua, o en la cercanía de los mismos, ni en áreas de desagües naturales. En caso de derrame durante la aplicación contener y absorber el producto derramado con un material inerte (arena, aserrín, tierra) y recoger con pala; depositar el material inermado en recipientes, en un sitio donde no haya peligro de contaminación de fuentes de agua. La protección de los polinizadores y en particular de la abeja es necesaria para la producción sostenible de alimentos y en varios cultivos está asociada a mayores cosechas. No dejar semilla tratada con este producto expuesta a ser consumida por animales domésticos o silvestres, principalmente aves. Peligrosidad en función de las toxicidades: Toxicidad para peces/organismos acuáticos: Moderadamente tóxico. Medidas de mitigación: No sembrar en áreas de desagües y surcos de erosión. No sembrar a una distancia a cuerpos de agua menor a 10 metros en aplicaciones terrestres y 30 metros aplicaciones aéreas. No lavar las sembradoras en lagos, ríos y otras fuentes de agua, ni en la cercanía de los mismos. Toxicidad para aves: Muy tóxico. Toxicidad para abejas: Altamente tóxico. Por su forma de uso (carbasulfamida) no representa un riesgo para las abejas. Toxicidad para organismos de suelo (lombrices): Ligeramente tóxico. Medidas de mitigación: Aplicaciones foliares. Utilizar solo en cultivos con coberturas totales o en ambientes controlados donde la deriva al suelo sea mínima. **Disposición final de envases:** Una vez vaciado el contenido del envase haga el "Triple Lavado" del mismo volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora. Luego perforsé el envase para evitar su reutilización. Traslade los envases con Triple Lavado al centro de recolección más cercano.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, ANIMALES DOMÉSTICOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS. EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLAMAR AL CIAT TELÉFONO: 21722, CONCURRIR AL MÉDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE. NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, UTENSILIOS DOMÉSTICOS Y VESTIMENTAS. NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA. Producto autorizado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. VENTA EXCLUSIVA BAJO RECETA PROFESIONAL. USO AGRÍCOLA. PROHIBIDO SU USO PARA FINES DESTINADOS A LOS ESPECIADOS EN LA ETIQUETA. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA. (Y EL FOLLETO ADJUNTO al envase). ANTES DE USAR EL PRODUCTO, EL LAVADO NO ELIMINA EL TÓXICO DE LA SEMILLA TRATADA. NO DEBE USARSE PARA TRATAR GRANDES DESTINADOS A ALIMENTACIÓN HUMANA O ANIMAL. NIPALA LA INDUSTRIALIZANTE.

Nota: LA FORJA S.A. garantiza la calidad de este producto. Dado sin embargo que su almacenaje, manejo, aplicación y destino fuera de su uso previsto, no puede ser responsabilidad de la empresa, no se responsabiliza por los daños y perjuicios que pudieran derivarse del empleo de este producto siguiendo o no las instrucciones de uso. Fabricante: Hims AgroScience Limited.



CLASE IB (UNO B)
ALTAMENTE PELIGROSO
IPCS/OMS, 2019



TÓXICO

