

Rice Protex800

DIETOLATE 800 g/L

PROTECTOR DE CULTIVO - CONCENTRADO SOLUBLE

PROTECTOR DE CULTIVO

Grupo químico a que pertenece el ingrediente activo: éster del ácido fosfórico.

Organofosforado.

Firma registrante: La Forja S.A. Ruta Nacional 101, km 24,500,

Canelones, Uruguay, Tel.: 598 2683 8815 - www.tafirel.com

CONTENIDO NETO 5 L

Fecha de Vto: 07/01/2027

N° de lote: 07012027

Origen: China

Fabricante: Hims AgroSciences Co., Limited.

DGSA REG N° 3656



TAFIREL

USO AGRÍCOLA LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y EL FOLLETO ADJUNTO -si existe-)

ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Empresa Certificada. ISO 45001: 2018 ISO SST N°: 29416/01

Clasificación Toxicológica Aguda: CLASE III (res) - LIGERAMENTE PELIGROSO (IPCS/OIMS, 2019)

Antídotos: No tiene antídoto.

Primeros Auxilios: En caso de ingestión, enjuague la boca. En caso de contacto con los ojos: lave inmediatamente dejando correr abundante agua limpia durante 15 minutos, manteniendo los párpados separados. En caso de contacto con la piel quite inmediatamente la ropa contaminada y lave la piel corriendo abundante agua durante 15 minutos. En caso de inhalación: retire a la persona del ambiente contaminado y llévala a un ambiente bien ventilado.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR AL CIAT APORTANDO NOMBRE COMERCIAL O NÚMERO DE REGISTRO, TELÉFONO 1722 Y CONCURRIR AL MÉDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE.

Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros:

Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos. No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto. Lavar cuidadosamente los elementos empleados que hayan tenido contacto con el producto. No destapar los picos de la pulverizadora con la boca.

Equipos de protección personal a utilizar durante la preparación y aplicación del producto: Usar guantes de nitrilo. Usar manguito impermeable exclusivo para la tarea que permita el intercambio de calor de material, fácilmente lavable y disponer de recambio en caso de accidente. Usar botas por dentro del manguito. Usar careta antiparras y máscara de tipo N100 con filtros de partículas y vapores orgánicos. Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto luego de cada aplicación y en el lugar de trabajo evitando la contaminación del trabajador y su familia.

Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos y peces, aves y polinizadores, lombrices: Medidas generales. No lavar ni vaciar equipos de aplicación en lagos, ríos, otras fuentes de agua o en la cercanía de los mismos, ni en áreas de desagues naturales. En caso de derrame durante la aplicación, contener y absorber el producto derramado con un material inerte (arena, aserrín, tierra) y recoger con pala; depositar el material impregnado en recipientes, en un sitio donde no haya peligro de contaminación de fuentes de agua. Llamar a DINACEA, teléfono 23001136 int. 4600. Peligrosidad del ingrediente activo formulado: **TOXICIDAD PARA ORGANISMOS ACUÁTICOS: MODERADAMENTE TÓXICO. TOXICIDAD PARA AVES: PRÁCTICAMENTE NO TÓXICO. TOXICIDAD PARA POLINIZADORES: ALTAMENTE TÓXICO**

Disposición final de envases: Una vez vaciado el contenido, en el caso de ENVASES RÍGIDOS (bidones, botellas) haga el "Triple Lavado" o "Lavado a presión" del mismo, volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora. Luego perforar el envase en su base para evitar su reutilización como tal. Separe las tapas de los envases para llevar por separado. Trasladar los envases al comercio que se los vendió o centro de acopio más cercano. Por más información contactarse con CAMPUIMPIO al 26254339 o info@campuimpio.org.uy

Instrucciones de almacenamiento: Guardar el producto en su envase original etiquetado, bien cerrado, en lugar fresco, ventilado, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar aislado de los recintos usado como vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas, raciones, fertilizantes, u otros similares. Debe estar claramente señalizado con un cartel que indique "Cuidado-Sustancia Tóxica"



MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS. EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR AL CIAT TELÉF: 1722. CONCURRIR AL MÉDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE. NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS. NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA. PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESPECIFICADOS EN LA ETIQUETA.

Generalidades del producto, modo y mecanismo de acción:

RICEPROTEX 800 es un producto que, utilizado en tratamiento de semillas de arroz, inhibe el efecto fitotóxico sobre el cultivo cuando se emplea el herbicida Clomazone. RICEPROTEX 800 estimula la actividad de las enzimas encargadas de metabolizar el Clomazone dentro de la planta de arroz y de esta forma, el herbicida no causa daño al cultivo a las dosis recomendadas de los productos registrados de Clomazone.

Instrucciones de uso:

Cultivo o sitio de aplicación	Observaciones
ARROZ (<i>Oryza sativa</i> L.)	600 – 800 cc/100 Kg semilla

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS:

Autorizado solo para las dosis registradas de clomazone.

Momento(s) de aplicación:

Tratar la semilla con el protector previo a la siembra. No más de 30 días antes de la siembra

Frecuencia, número o espaciamiento de las aplicaciones, si corresponde:

Una dosis en la semilla antes de sembrar. No repetir el tratamiento sobre semilla ya tratada.

Modo de preparación y técnica de aplicación:

Tratar la semilla con máquinas específicas diluyendo la dosis del producto con 1 litro de agua cada 100 kg. de semilla. En caso de mezclar con otros productos, adicionar el protector por último. Continuar con la rotación hasta que la semilla quede uniformemente tratada. No efectuar el llenado con agua de la maquinaria de aplicación directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, lo cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermedios.

Compatibilidad y fitotoxicidad:

En general es compatible con los insecticidas y fungicidas usados como curasemilla. En caso de mezclar con otros productos y desconocer o tener dudas sobre el comportamiento físico, o sobre la efectividad agronómica o sobre la fitotoxicidad de la mezcla, realizar una prueba a pequeña escala antes de su aplicación en todo el cultivo.

Tiempos de espera:

No corresponde por su modo de empleo.

Nota: LA FORJA S.A. Garantiza la calidad de este producto. Dado sin embargo que el almacenaje, manejo y aplicación se realizan fuera de su control y en condiciones de medio variable, ésta no se hace responsable por los daños y perjuicios que pudieran derivarse del empleo de este producto siguiendo o no las instrucciones de uso.



CUIDADO

