

Firma registrante: La Forja S.A.
Ruta Nacional 101, Km 24,500
Canelones Uruguay.
598 2 683 8815 / Fax: +598 2 683 8626
www.tafirel.com tafirel@tafirel.com

Instrucciones de almacenamiento: Guardar el producto en su envase original, etiquetado, bien cerrado, en lugar fresco, ventilado, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar alejado de los residuos usados como vivienda, almacén de utensilios, bodegas, raciones, fertilizantes, u otros similares. Debe estar bien sellado y en su envase original.

Generalidades, modo de acción sobre la plaga o el cultivo: Captura ZC es un insecticida que controla a gran variedad de larvas de lepidópteros, acelerando su proceso de muerte y con acción oculta. Actúa como simulador de la edodina (feromona de la muda), induciendo una muda prematura letal, poco tiempo después de aplicado.

Instrucciones de uso y dosis:

Cultivo o sitio de aplicación	Plagas		Dosis	Momento de aplicación
	Nombre común	Nombre científico		
SOJA (<i>Glycine max</i>)	Lagarta de las leguminosas Lagaria del gresol	<i>Anticarsia gemmatalis</i> <i>Rachispodius nu</i>	120 c/ha	Comenzar los tratamientos cuando la defoliación es superior al 20% antes de la floración. Realizar la aplicación en el maduración de grano y se encuentren más de 15 orugas/m de surco y cuando las orugas se encuentren entre los estadios L1-L3.
	Lagaria cogollera	<i>Spodoptera frugiperda</i>	100 c/ha	
	Epinota	<i>Crocidosema aporema</i>	200 c/ha	
MAÍZ (<i>Zea mays</i>)	Lagaria cogollera	<i>Spodoptera frugiperda</i>	150 - 200 c/ha	Aplicar preventivamente, con presencia de larvas de primeros estadios. Utilizar alto volumen de agua (120-150 L/ha) y surfactante no línico como coadyuvante.
TRIGO (<i>Triticum aestivum</i>)	Lagarta de los cereales	<i>Pseudeletia adultera</i>	100 - 200 c/ha	Aplicar preventivamente (una o dos fungicidas) o con presencia de larvas pequeñas (L1-L3). Utilizar surfactante no-línico como coadyuvante.
MANZANO (<i>Malus domestica</i>)	Carpocapsa	<i>Cydia pomonella</i>	600 c/ha 40 c/ 100 litros agua (1.500 L/ha gasto total)	Aplicar al inicio de cada periodo de crecimiento de la fruta. Para reacciones, considerar 14 días de residuabilidad. Utilizar surfactante no-línico como coadyuvante.
PERAL (<i>Pyrus communis</i>)	Grafalita	<i>Cydia molesta</i>		
DURAZNERO (<i>Prunus persica</i>)	Grafalita	<i>Cydia molesta</i>		
TOMATE (<i>Solanum lycopersicum</i>)	Pollía del tomate	<i>Tuta absoluta</i>	50 c/ 100 litros agua	Aplicar la aplicación de la plaga. Residuar cada 7 días. Utilizar surfactante no-línico como coadyuvante. A los efectos de prevenir el surgimiento de resistencias, se recomienda alternar su uso con el de otro principio activo con diferente modo de acción.

Momento de aplicación: Ver cuadro de instrucciones de uso y dosis. **Número, frecuencia o espaciamiento de aplicaciones si corresponde:** Se pueden repetir las aplicaciones dependiendo de la presión de la plaga.

Repidex 240 SC

Metoxifenocida 240 g/L

Insecticida

Suspensión concentrada



TAFIREL

COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO:

Nombre común del ingrediente activo: (ISO)	Porcentaje en peso	Contenido en volumen
METOXIFENOCIDA	22.9%	240 g/L

Grupo químico al que pertenece el ingrediente activo: Diacilhidrazina

**CUIDADO
CLASE IV (CUATRO)
POCO PELIGROSO EN EL USO NORMAL
IPCS/ OMS 2009**



**Empresa Certificada.
ISO 9001:2015
LSQA N°: 1559/01**

Contenido Neto: 1 L
Fecha de Vencimiento: 16/05/2025
Número de Lote: 16052025
Origen: China
DGSA REG N° 4067

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. ANIMALES DOMÉSTICOS Y PERSONAS INEXPERTAS. EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLAMAR AL CÁT. TELÉFONO: 21722. CONCURRIR AL MEDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL PRODUCTO O EL ENVASE. NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, UTENSILIOS DE DOMÉSTICOS O ENVESTIMENTOS. NO HACER USO NI PUNTOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTROS FUENTES DE AGUA, PROHIBIDO POR EL MINISTERIO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA. USO AGRÍCOLA PROHIBIDO Y SU USO PARA FINES CONSTITUTIVOS A LOS ESPECIFICADOS EN LA ETIQUETA. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA Y EL FOLLETO ADJUNTO (VER INSTRUCCIONES) ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

Nota: LA FORJA S.A. garantiza la calidad de este producto. Dado sin embargo que su almacenaje, manejo y aplicación se realizan fuera de su control y en condiciones de medio variable, ésta no se hace responsable por los daños y perjuicios que pudieran derivarse del empleo de este producto siguiendo o no las instrucciones de uso. Fabricante: Trustchem Co., Ltd.

