

WEEDEXmax

2,4 D - SAL DIMETILAMINA 720 g/L - EQUIVALENTE EN 2,4 D 600 g/L
HERBICIDA - CONCENTRADO SOLUBLE

Grupo WSSA	4	HERBICIDA
------------	---	-----------

GRUPO QUÍMICO A QUE PERTENECE EL INGREDIENTE ACTIVO:
ACIDO FENOXICARBOXILICO.

Firma registrante: La Forja S.A
Ruta Nacional 101, Km 24,500
Canelones, Uruguay
Tel: 598 2 683 8815/ Fax: 598 2 683 8626
www.tafirel.com tafirel@tafirel.com



USO AGRÍCOLA LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y EL FOLLETO ADJUNTO –si existe–)
ANTES DE USAR EL PRODUCTO
Empresa Certificada, ISO 45001: 2018 LSQA SST N°: 29416/01

Fecha de Vencimiento.: 11/07/2026
N° Lote: 11072026
Origen: China
Fabricante: JINGMA CHEMICAL CO., LTD.
DGA REG N° 4385
CONTENIDO NETO 20 L

Clasificación Toxicológica Aguda: Clase II (DOS), MODERADAMENTE PELIGROSO (IPCS/OMS 199),

Antídotos: No tiene antídoto.

Primeros auxilios: En caso de ingestión: No producir el vómito. Contacto con los ojos: lavado con abundante agua limpia durante 15 minutos manteniendo los párpados separados. Contacto con la piel: quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua. En caso de inhalación: retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarlo a un lugar bien ventilado.

EN CASO DE EMERGENCIA LLAMAR AL CIAT APORTANDO NOMBRE COMERCIAL O NÚMERO DE REGISTRO, TELÉFONO 1722 Y CONCURRIR AL MÉDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE.

Otras advertencias: PUEDE CAUSAR REACCIÓN ALÉRGICA DE PIEL Y RESPIRATORIA, PUEDE CAUSAR SEVERO DAÑO OCULAR

Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros: Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos. No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto. Lavar cuidadosamente los elementos empleados que hayan tenido contacto con el producto. No destapar los picos de la pulverizadora con la boca.

Equipos de protección personal a utilizar durante la preparación y aplicación del producto: Usar guantes, botas, máscara de protección respiratoria, antiparras y ropa adecuada (EPP) durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Lavar el equipo protector luego de cada aplicación.

Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos y peces, aves y polinizadores, lombrices: Medidas generales. No producir deriva. No lavar ni vaciar equipos de aplicación en lagos, ríos, otras fuentes de agua o en la cercanía de los mismos, ni en áreas de desagües naturales. En caso de derrame durante la aplicación, contener y absorber el producto derramado con un material inerte (arena, aserrín, tierra) y recoger con pala; depositar el material impregnado en recipientes, en un sitio donde no haya peligro de contaminación de fuentes de agua. Llamar a DINACEA, teléfono 29006136 int. 4600. La protección de los polinizadores es necesaria para la producción sostenible de alimentos. Peligrosidad del ingrediente activo, TOXICIDAD PARA ORGANISMOS ACUÁTICOS: LIGERAMENTE TÓXICO. TOXICIDAD PARA AVES: LIGERAMENTE TÓXICO. TOXICIDAD PARA POLINIZADORES: PRÁCTICAMENTE NO TÓXICO. TOXICIDAD PARA ORGANISMOS DE SUELO (Lombrices): MODERADAMENTE TÓXICO - A LAS DOSIS RECOMENDADAS EL RIESGO ES ACEPTABLE. Destino Ambiental: Alta solubilidad en agua, hidrofílico, ligeramente persistente y muy móvil en suelo, por lo tanto, tiene peligro de lixiviación hacia aguas subterráneas. Disposición final de envases: Una vez vaciado el contenido, en el caso de ENVASES RÍGIDOS (bidones, botellas) haga el "Triple Lavado" o "Lavado a Presión" del mismo, volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora. Luego perforo el envase en su base para evitar su reutilización como tal. Separe las tapas de los envases para llevar por separado. Traslada los envases al comercio que se los vendió o centro de acopio más cercano. Por más información contactarse con CAMPO LIMPIO al 29254539 o info@campolimpo.org.uy Instrucciones de almacenamiento: Guardar el producto en su envase original etiquetado, bien cerrado, en lugar fresco, ventilado, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar aislado de los recintos usado como vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas, raciones, fertilizantes, u otros similares. Debe estar claramente señalado con un cartel que indique "Cuidado-Sustancia Tóxica" (Pictograma de calavera).

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS. EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR AL CIAT TELÉF: 1722. CONCURRIR AL MÉDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE. NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA. PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESPECIFICADOS EN LA ETIQUETA.

Generalidades del producto, modo y mecanismo de acción: WEEDEX MAX es un herbicida sistémico, selectivo, y de acción hormonal recomendado para el control de malezas de hoja ancha en post-emergencia. Su modo de acción es de auxina sintética. El producto se transloca por xilema y floema, produciendo enrollamiento de hojas apicales y clorosis generalizada de la planta, hasta su muerte

Instrucciones de uso:

Cultivo o sitio de aplicación	Malezas		Dosis
	Nombre común	Nombre científico	
TRIGO (<i>Triticum aestivum</i> L.) CEBADA (<i>Hordeum vulgare</i> L.) AVENA (<i>Avena sativa</i> L.) CENTENO (<i>Secale cereale</i> L.) ALPISTE (<i>Phalaris canariensis</i> L.)	Abrojo Capiquí Cardo Negro Cepa caballo Cerraja Corregüela Chamico Diente de león Mostacilla Lengua de vaca Llantén Quinoa Sanguinaria Verdolaga Yuyo colorado	<i>Xanthium cavanillesii</i> <i>Stellaria media</i> <i>Cirsium Vulgare</i> <i>Xanthium Spinosum</i> <i>Sonchus oleraceus</i> <i>Convolvulus arvensis</i> <i>Datura ferox</i> <i>Teraxacum officinale</i> <i>Rapistrum rugosum</i> <i>Rumex crispus</i> <i>Plantago lanceolata</i> <i>Chenopodium album</i> <i>Polygonum aviculare</i> <i>Portulaca oleracea</i> <i>Amaranthus quitensis</i>	0,5 – 1,0 L/ha 0,5 – 0,7 L/ha 1,0 – 1,5 L/ha 0,7 – 1,0 L/ha
MAÍZ (<i>Zea mays</i> L.) SORGO (<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench.)			
ARROZ (<i>Oryza sativa</i> L.)			
CAÑA DE AZÚCAR (<i>Saccharum officinarum</i> L.)			

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS: La maleza debe estar en crecimiento activo. Momento(s) de aplicación: Trigo, Cebada, Avena, Centeno y Alpiste: Desde Z21 hasta Z29. Maíz y Sorgo: Aplicar entre V2 y V6. Cuando el cultivo esté más desarrollado evitar aplicaciones mojado todo el follaje, efectuar aplicaciones dirigidas. Arroz: Aplicar hasta primer rudo. Caña de Azúcar: Aplicar en post-emergencia, con plantas de más de 20 cm. Frecuencia, número o espaciamiento de aplicaciones si corresponde: Una sola aplicación por ciclo de cultivo. Modo de preparación y técnica de aplicación: Calidad de agua: Si el agua es dura (niveles superiores a 150 ppm CaCO₃), deberá usarse un secuestrante de caltones, previo al agregado de los productos, con el fin de evitar pérdida del químico en el tanque. Esta corrección, a su vez, mejora la penetración foliar. El pH de estabilidad para herbicidas está entre 4 y 6. Medir el pH del agua, previo a agregar los productos y luego de tener pronta la mezcla. Lo importante, es el pH de la mezcla realizada. La calidad del agua queda determinada por la ausencia de partículas de suelo o materia orgánica dispersas en el agua. Hay productos que se adsorben fácilmente a estos sólidos disueltos en el agua. Eso significa la pérdida de producto biológicamente activo y, por ende, baja efectividad del mismo. Modo de preparación: Colocar agua en el tanque, preferentemente, hasta el 75% de tal manera, que los químicos a ir agregando de a uno, no se mezclen a altas concentraciones. Se prende el revolvedor y se comienza con el proceso de carga de los fitosanitarios. SIEMPRE SE DEBE APLICAR CON REVOLVEDOR PRENDIDO. Tecnología de aplicación: Aplicar con equipos terrestres o aéreos. Realizar aplicaciones diurnas. El tamaño de gota mínimo recomendado, es de 250 µm (micrones) de DMV. En función de las condiciones climáticas (temperatura, humedad relativa y velocidad del viento), se decidirá ese tamaño de gota o uno superior a utilizar. Se buscará eficacia máxima, sin generar deriva. El volumen de aplicación se aumentará a medida que se aumenta el tamaño de gota, para mantener coberturas similares. Restricciones Legales para la Aplicación de Productos Fitosanitarios: Resol, sin de 14/5/2004 y N° 188 DE 25/3/2011. No realizar aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centros poblados y centros educativos. No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos (cereales, oleaginosos y forrajeros) a una distancia inferior a 300 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centros poblados y centros educativos. Resol, N°129 de 27/2/2008 -No realizar aplicaciones aéreas en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 30 metros de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas) o fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares). No realizar aplicaciones terrestres con máquinas autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 metros de cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales. No efectuar el llenado con agua de la maquinaria de aplicación directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, lo cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermedios. Compatibilidad y fitotoxicidad: En caso de mezclar con otros productos y desconocer o tener dudas sobre el comportamiento físico-químico o sobre la fitotoxicidad de la mezcla, realizar una prueba a pequeña escala antes de su aplicación en todo el cultivo en una botella limpia. Para conocer la compatibilidad de los fitosanitarios al agregar al tanque de pulverizar, se debe hacer una prueba a escala en una botella (preferentemente de agua y no de bebida cola). Hecha la mezcla a escala, se agita y posteriormente se deja en reposo y se analiza a 1, 5, 10 y 30 minutos. Si luego de 1 minuto, la mezcla se corta, no deberá aplicarse. Si el corte está entre los 5 y 10 minutos, con agitación se puede aplicar. Si a los 30 minutos, no se cortó, se considera que la mezcla es estable. Tiempo de reintegro al cultivo: No ingresar al área tratada hasta que la pulverización haya secado completamente, dejando transcurrir como mínimo 24 horas. Otras informaciones necesarias respecto al uso: Prevención de resistencia: se recomienda rotar o combinar con otros ingredientes activos de diferentes mecanismos de acción, para prevenir la ocurrencia de biotipos resistentes. Se debe observar la presencia de malezas sin controlar eliminando las malezas sobrevivientes para evitar su propagación.

Nota: LA FORJA S.A. garantiza la calidad de este producto. Dado sin embargo que su almacenaje, manejo y aplicación se realizan fuera de su control y en condiciones de medio variable, ésta no se hace responsable por los daños y perjuicios que pudieran derivarse del empleo de este producto siguiendo o no las instrucciones de uso.



NOCIVO

