

Empresa Certificada.
ISO 9001:2008
LSQA N°: 1559/01
IQNet N°: 13553/0

DGSSAA REG N° 4627

2,4DB Ester Isobutilico 930 g/l
Equivalente en 2,4DB 760 g/l
Herbicida - Concentrado Emulsionable.



TAFIREL

Instrucciones de almacenamiento: Guardar el producto en su envase original etiquetado, bien cerrado, en lugar fresco, ventilado, seco y seguro (bajo lava). El depósito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar aislado de los recintos usados como vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas, raciones, fertilizantes u otros similares. Debe estar claramente señalizado con un cartel que indique "Cuidado, veneno (calavera)".

Generalidades, modo de acción sobre la plaga o el cultivo: WEED KILL, es un herbicida selectivo de post-emergencia y sistémico. Se encuentra indicado para el control de malezas de hoja ancha en pasturas de gramíneas asociadas con leguminosas y cultivos de trigo y cebada asociados a leguminosas. Su acción se produce al penetrar en el sistema vascular de la planta, donde se acumula en la ARN polimerasa, causando malformaciones y detención del crecimiento. Dado que circula por el floema y por el xilema, que puede ser absorbido una vez que el producto llega al suelo. Las leguminosas logran transformarlo por lo que se comporta selectivamente.

Cultivo o sitio de aplicación	Malezas		Dosis (l/ha)	Momento de aplicación
	Nombre Común	Nombre Científico		
Pasturas de gramíneas asociadas con leguminosas	Abrojo	Xanthium cavanillesii	1.0 - 1.5	Aplicar en pasturas integradas por gramíneas unicarpentas o asociadas con digitos leguminosas como alfalfa, trébol rojo, trébol blanco, lotos corniculatus.
	Capicú	Stellaria media		
	Cardo anual	Silene maritimum		
	Cardo crespo	Carduus rularis		
	Cardo Negro	Cirsium vulgare		
	Cepa caballo	Conyolium spinosum		
	Cerraja	Sedum oleraceus		
	Correigeta	Convolvulus arvensis		
	Chamico	Geranium flexu		
	Diente de león	Taraxacum officinale		
	Enredadera	Rumex convolvulus		
	Moscata	Portulaca oleraceus		
	Lengua de vaca	Polygonum crispum		
	Polvareda	Polygonum lanceolata		
	Nabo	Brassica campestris		
	Quinoa	Chenopodium album		
	Sanguinaria	Polygonum aviculare		
	Verdoluga	Portulaca oleracea		
Yuyo colorado	Amaranthus quitensis			
Flor de pajaro	Amaranthus caudalis			

PREVENCIÓN DE RESISTENCIA: SE RECOMIENDA ROTAR O COMBINAR CON OTROS HERBICIDAS DE DIFERENTE MECANISMO DE ACCIÓN, PARA PREVENIR LA OCURRENCIA DE BIOTIPOS RESISTENTES. SE DEBE OBSERVAR ALGUNA MALEZA QUE HAYA PERMANECIDO SIN CONTROLAR, INVESTIGANDO LA CAUSA DE SU PERMANENCIA, ELIMINÁNDOLA PARA QUE NO SE PROPAGUE.

de agua. Una vez logrado esto, verterla al tanque de la máquina pulverizadora con el resto del agua necesaria para el

AGRICOLA. PROHIBIDO SU USO DISTINTO A LOS ESPECIFICADOS EN LA ETIQUETA. LEA LA ETIQUETA*

Nota: LA FORJA S.A. garantiza la calidad de este producto. Dado sin embargo que su almacenaje, manejo y aplicación se realizan fuera de su control y en condiciones de medio variable, ésta no se hace responsable por los daños y perjuicios que pudieran derivarse del empleo de este producto siguiendo o no las instrucciones de uso. Fabricante: Zhejiang E-Tong Chemical Co., Ltd.

