

ABATOP 3.6 EC

Insecticida Acaricida - Concentrado emulsionable

Ficha Técnica



Características:

ABATOP 3.6 EC es un insecticida acaricida que actúa por contacto e ingestión. Se utiliza para el control de minadores de frutales y ácaros. Está recomendado su uso en tomate, citrus, algodón, frutilla, flores, soja, entre otros. Es efectivo sobre estados larvales de ácaros y estados móviles de minadores.

Ventajas:

- POSEE ACCIÓN TRANSLAMINAR, CONTROLA INSECTOS QUE SE ENCUENTREN EN EL ENVÉS DE LAS HOJAS.
- BUEN PODER RESIDUAL, SE RETIENE EN LA PLANTA.
- PARA TRATAMIENTOS PREVENTIVOS O CURATIVOS.

ABATOP 3.6 EC

Insecticida Acaricida - Concentrado emulsionable

Principio Activo: Abamectina 36 g/L
Formulación: Concentrado emulsionable
Grupo Químico: Avermectinas

Modo de acción:

Actúa por contacto e ingestión, e interfiere en la transmisión de los impulsos nerviosos provocando que los insectos y ácaros queden paralizados inmediatamente, dejando de alimentarse de la planta, para luego provocarles la muerte.

Otros productos:

GEOTRIN

Tiametoxan 300g/L + Bifentrin 200 g/L

BIFENTRIN TAFIREL

Bifentrin 200 g/L

Clorpirifos Tafirel

Clorpirifos 480 g/L

Adherex OLEO

Aceite de Soja desgomado 880 g/L

TABLA DE USOS

Cultivo o sitio de aplicación	Plaga		Dosis	Momento de aplicación
	Nombre común	Nombre científico		
CÍTRICOS: NARANJO (<i>Citrus x sinensis</i>) LIMONERO (<i>Citrus x limon</i>) MANDARINO (<i>Citrus reticulata</i>)	Minador de los brotes de los cítricos	<i>Phyllocnistis citrella</i>	15 cc / 100 L de agua	Aplicar cuando existen brotes con posibilidad de ser atacados, con intervalos de no más de 15 días.
SOJA (<i>Glycine max L.</i>)	Arañuela roja	<i>Tetranychus urticae</i>	250 cc/ha.	Quando se alcance los umbrales de daño económico.
TOMATE (<i>Solanum lycopersium</i>)	Arañuela roja	<i>Tetranychus urticae</i>	25 - 35 cc / 100 L de agua	A la aparición de la plaga.
MANZANO (<i>Malus domestica</i>)			15 - 25 cc / 100 L de agua	
PERAL (<i>Pyrus communis</i>)	Psila del peral Arañuela roja	<i>Cacopsylla pyricola</i> <i>Tetranychus urticae</i>	15 - 25 cc / 100 L de agua	A la aparición de las primeras larvas, a la caída de pétalos y en otoño luego de la cosecha.
PASTURAS ASOCIADAS GRAMÍNEAS Y LEGUMINOSAS	Arañuela roja	<i>Tetranychus urticae</i>	250 cc / ha	A la aparición de la plaga.

Tiempo de espera:

Cítricos: 7 días; Soja y Pasturas: 30 días; Tomate: 3 días; Manzano y Peral: 30 días.



Información adicional:

- En citrus, para el minador de las hojas en vivero, aplicar cuando existen brotes con posibilidad de ser atacados, con intervalos de no más de 15 días.
- Para soja cuando se alcance los umbrales de daño económico.
- Aplicar Abatop 3.6 EC + 1L de Adherex OLEO /ha



Ruta Nacional 101, km 24,500,
Canelones Uruguay.
Tel.: 598 2 683 8815
www.tafirel.com



TAFIREL

Descargá nuestro catálogo

