Azufrate 80 DF

FICHA TÉCNICA

FUNGICIDA







CARACTERÍSTICAS:

AZUFRATE 80 DF es un fungicida y acaricida de finura adecuada, con actividad multisitio de contacto, que dispersado adecuadamente sobre el follaje asegura una buena acción preventiva contra enfermedades como sarna del manzano y peral, oídio y erinosis de la vid.

VENTAJAS:

- SU BUENA ADHERENCIA AL FOLLAJE Y FRUTOS LE PROPORCIONA UN BUEN PODER RESIDUAL.
- ALTA EFICACIA COMO PREVENTIVO DE DIFERENTES OÍDIOS EN FRUTALES Y HORTALIZAS.
- NO PRODUCE ESPUMA NI APELOTONAMIENTOS DURANTE LA PREPARACIÓN DEL CALDO.

LA FORJA S.A.
Empresa con sistema de gestión en calidad certificada
LSQA CERTIFICADO CERTIFICATE
ISO 9001:2015 REG. 1559/01

TAFIREL

Azufrate 80 DF

PRINCIPIO ACTIVO: Azufre 80%

FORMULACIÓN: Granulado dispersable

GRUPO QUÍMICO: Inorgánio

INFORMACIÓN EXTRA:

No aplicar con temperaturas mayores a 28-30°c ni en horas de sol muy fuerte. No aplicar con hoja mojada, en días nublados con alta humedad ambiente, ni cuando se prevén rocíos fuertes o heladas.

Cultivos tales como melón, pepino y sandía pueden ser sensibles a su aplicación.Se deben suspender los tratamientos entre floración y cuajado de frutos. En viña suspender el tratamiento cuando las uvas toman color.

Las dosis menores son para tratamientos preventivos y las mayores para preflorales o curativos.
No es compatible con líquidos emulsionables, aceites, cúpricos, o productos a base de nitritos. En general compatible en mezcla con fungicidas e insecticidas de uso común.

MODO DE ACCIÓN:

El azufre posee un modo de acción multisitio, actuando sobre las células de los hongos, donde interfiere en su respiración mitocondrial inhibiendo así su desarrollo sobre la superficie de las plantas.

TIEMPOS DE ESPERA:

No posee

TABLA DE USOS:

INSTRUCCIONES DE USO:			
Cultivos	Enfermedad		Dosis grs/lts
	Nombre común	Nombre científico	
MANZANO *(Malus domestica)*	Sarna	*Venturia inaequalis* *Venturia pyrina*	300-700
PERAL *(Pyrus communis)*	Oídio	*Podosphaera leucotricha*	200-400
VID *(Vitis spp.)*	Oídio	*Uncinula necator*	200-400
	Erinosis de la vid	*Colomerus vitis*	
ZAPALLO *(Cucurbita máxima)* **SANDÍA** *(Citrullus lanatus)* **MELÓN** *(Cucumis melo)* **PEPINO** *(Cucumis sativus)*	Oídio	*Uncinula necator*	200-400

MOMENTO DE APLICACIÓN:

MANZANO: En pre floración. **PERAL:** En pos floración. **VID, Oídio:** En brotación, durante floración y antes del envero. **VID, Erinosis de la vid:** Al aparecer los primeros sintomas. **ZAPALLO, SANDÍA, MELÓN, PEPINO:** Desde que se inicia la brotación.



TAMBIÉN CONFÍE EN:

Captan Tafirel
Folpet Tafirel
MANCOZATE
ZIRAM Tafirel