



Bypex 40

Herbicida - Suspensión concentrada

Ficha Técnica



Características:

Herbicida de acción sistémica para uso en post emergencia en el cultivo de arroz para el control de malezas gramíneas, ciperáceas y alguna hoja ancha.

Ventajas:

- AMPLIO ESPECTRO DE ACCIÓN.
- EXCELENTE CONTROL DE CAPÍN.
- MUY BUEN CONTROL DE CIPERÁCEAS ANUALES.
- BUEN PERFIL ECO-TOXICOLÓGICO.

Bypex 40

Herbicida - Suspensión concentrada

Principio Activo: Bispiribac-Sodio 400 g/L
Formulación: Suspensión concentrada
Grupo Químico: Pirimidiniloxibenzoico

Modo de acción:

Es absorbida tanto por el follaje como por las raíces, translocándose por toda la planta. Actúa como regulador de crecimiento inhibiendo la enzima aceto lactato sintetasa (ALS). Las especies susceptibles presentan disminución del crecimiento, clorosis y posteriormente una coloración marrón sobre la lámina foliar y tallos, seguido del necrosamiento de los puntos de crecimiento que determinan la muerte de la planta en aproximadamente 20 días.

- Puede ser aplicado en mezcla con Capinex (Quinclorac) y Clomanex (Clomazone). No se aconseja la mezcla con Propanil.
- Debe aplicarse sobre el cultivo seco, desde el estadio de 4 hojas desplegadas hasta 2 macollos y re-inundar a las 48 horas del tratamiento.

T
A
B
L
A

D
E

U
S
O
S

Cultivo o sitio de aplicación	Malezas		Dosis (cc/ha)
	Nombre común	Nombre científico	
ARROZ (<i>Oryza sativa</i>)	Capín del arroz	Echinochloa crusgalli	100-125
	Capín del arroz	Echinochloa cruspavonis	
	Gramilla de rastrojo	Echinochloa colona	
	Pasto colorado	Echinochloa helodes	
	Gambarrusa	Alternanthera philoxeroides	
	Verdolaga	Portulaca oleracea	
	Achira	Sagitaria montevidensis	
	Pasto bolita	Cyperus rotundus	

Momento de aplicación: BYPEX 40 SC puede ser aplicado: De 14 a 21 días desde la emergencia del arroz y con las malezas en estado de 3 a 5 hojas, y previamente a la inundación del cultivo. No aplicar con el cultivo y malezas en stress hídrico. Se recomienda aplicar con humedad en el suelo e inundar entre 1 y 3 días después de la aplicación.

Tiempo de espera: Arroz: 45 días.



Capinex PRONTO Gramanex

Quinclorac 50 o 250 g/L

Penoxsulan 240 g/L

Cyhalofop-butil 285 g/L



Ruta Nacional 101, km 24,500,
Canelones Uruguay.
Tel.: 598 2 683 8815
www.tafirel.com



TAFIREL



Descargá nuestro catálogo

