

FLUROXYPYR TAFIREL

Herbicida - Concentrado emulsionable

Ficha Técnica



Características:

FLUROXYPYR TAFIREL es un herbicida post-emergente sistémico de la familia de los hormonales. Indicado para el control de malezas de hoja ancha en cultivos de trigo, cebada, maíz, sorgo, gramíneas forrajeras y arroz. En barbecho químico, en mezcla de tanque con glifosato, permite aumentar el espectro de control de malezas de hoja ancha, así como la velocidad de muerte.

Ventajas:

- Sin restricciones para la siembra de cultivos susceptibles por su casi nula residualidad.
- Excelente comportamiento en mezcla con Improsate Gold para barbechos cortos
- Ideal para el control de soja guacha, trébol blanco o carniceras.



TAFIREL

FLUROXYPYR TAFIREL

Herbicida - Concentrado emulsionable

Principio activo: Fluroxipir-meptil 480 g/L
Formulación: Concentrado emulsionable
Grupo químico: Ácido carboxílico

Modo de acción:

Su mecanismo de acción es mimetizador de la auxina, inhibiendo el crecimiento, interfiriendo en la elongación celular, dando una sintomatología de enrollamiento de las hojas terminales de las malezas, con posterior clorosis y muerte.

Tiempo de espera:

Cereales: 40 días.

Cereales y gramíneas forrajeras para pastoreo: 7 días.

Cebolla: 42 días.

T A B L A D E U S O S	Cultivo o sitio de aplicación	Maleza		Dosis	Momento de aplicación
		Nombre común	Nombre científico		
	TRIGO (<i>Triticum aestivum</i>) CEBADA (<i>Hordeum vulgare</i>) AVENA (<i>Avena sativa</i>) (*) PRADERA DE GRAMINEAS.	Biznaga Sanguinaria Enredadera Cardo ruso Cardo negro Mostacilla Rábano	<i>Ammi viznaga</i> . <i>Polygonum aviculare</i> <i>Polygonum convolvulus</i> <i>Carduus nutans</i> <i>Cirsium vulgare</i> <i>Rapistrum rugosum</i> <i>Raphanus raphanistrum</i>	180-300 cm ³ /ha	Aplicar desde que el cereal tenga 2 hojas hasta embuche. Desde el momento del macollaje con malezas pequeñas.
	MAÍZ (<i>Zea mays</i>) SORGO (<i>Sorghum spp.</i>)	Abrojo grande Cepa caballo Chinchilla Verdolaga	<i>Xanthium cavanillesii</i> <i>Xanthium spinosum</i> <i>Tagetes minuta</i> <i>Portulaca oleracea</i>	210-300 cm ³ /ha	Aplicar en cobertura total entre las 2 y 6 hojas (10-20 cm de altura). Cuando el cultivo tenga más de 40 cm de altura aplicar en forma dirigida mediante caños de bajada.
	ARROZ (<i>Oryza sativa</i>)				Aplicar sobre suelo seco y bien drenado a partir de las 3 hojas del cultivo al macollaje.
	BARBECHO	Lengua de vaca Cardo ruso Cardo negro Verdolaga Yerba carnífera Yerba carnífera	<i>Rumex crispus</i> <i>Carduus nutans</i> <i>Cirsium vulgare</i> <i>Portulaca oleracea</i> <i>Conyza bonariensis</i> <i>Conyza sumatriensis</i>	210-300 cm ³ /ha	Previo a la siembra de girasol, soja, papa y leguminosas forrajeras. En mezcla con glifosato 2-4 L/ha (360 g e.a./L). Sin restricciones para la siembra. La conyza spp. en estado de roseta.
	CEBOLLA (<i>Allium cepa</i>)	Biznaga Sanguinaria Enredadera anual Cardo ruso Cardo negro	<i>Ammi viznaga</i> <i>Polygonum aviculare</i> <i>Polygonum convolvulus</i> <i>Carduus nutans</i> <i>Cirsium vulgare</i>	450-600 cm ³ /ha	Aplicar después del arraigamiento de la cebolla y las malezas tengan buen desarrollo foliar.

Compatible con:

**Improsate
GOLD**

Glifosato, Sal Dimetilamina 608 g/L

WEEDEx^{max}

Sal Dimetilamina del 2,4-D 720 g/L

HerbexMax

Metsulfuron metil 75%



CLORANSULEX

Cloransulam metil 84%

PRUEBA DE EFICACIA AGRONÓMICA DE FLUROXYPYR TAFIREL EN EL CONTROL DE CONYZA (2014)

Ubicación: Paraje Calera de las Huérfanas – Carmelo, Colonia. Productor: Establecimiento “Chiruca”
Variedad: Barbecho para soja Diseño: Parcelas al azar con cuatro repeticiones, cada parcela de 3x20m
Equipo: Máquina costal a motor, equipada con válvula de presión constante regulada a 2 atmósferas y un gasto de agua de 100 L/ha

Detalles de ensayo: Al momento de la instalación del ensayo había 5 plantas de Conyza /m² en estado de roseta y algunas elongándose, con una altura de no más de 10 cm.

Porcentaje de control de Conyza spp para los distintos tratamientos, en las distintas fechas de muestreo:

		30/11 10 dda	11/11 22 dda
1	TESTIGO ABSOLUTO	0 a	0 a
2	TESTIGO QUÍMICO (300)	61.3 bc	100 c
3	FLUROXYPYR TAFIREL (250)	55 b	90 b
4	FLUROXYPYR TAFIREL (300)	62.5 c	90.3 bc
5	FLUROXYPYR TAFIREL (350)	66.3 c	100 c
6	FLUROXYPYR TAFIREL (400)	67.5 c	100 c

Conclusión: En las condiciones del ensayo se lograron excelentes niveles de control de Conyza, iguales a los del testigo químico. Se pudo observar un efecto dosis, donde a partir de 300 cc/ha se igualan los controles al testigo.



Descargá nuestro catálogo



Ruta Nacional 101, km 24,500,
Canelones Uruguay.
Tel.: 598 2 683 8815
www.tafirel.com



TAFIREL