

Características:

Es un herbicida selectivo con acción residual para el control de malezas de hoja ancha en cultivos y pasturas puras o consociadas de leguminosas y/o gramíneas. Se puede usar tanto en pre como en post emergencia. Utilizado también en pre emergencia de soja.

Ventajas:

- COMPATIBLE CON MAYORÍA DE HERBICIDAS, FUNGICIDAS E INSECTICIDAS UTILIZADOS EN PASTURAS.
- EFECTIVO EN SIEMBRA DIRECTA DEBIDO A SU BAJA RETENCIÓN SOBRE RASTROJO.
- ALTA RESIDUALIDAD, HASTA 35 DÍAS DE CONTROL
- SINERGISMO DE CONTROL EN MEZCLA CON GLIFOSATO.
- FACILIDAD DE MANEJO DEBIDO A SU FORMULACIÓN GRANULADA





GREENEX 80 WDG

Herbicida - Gránulos dispersables

Principio Activo: Flumetsulam 80% Formulación: Gránulos dispersables Grupo Químico: Triazolpirimidina Sulfonamida

Modo de acción:

Es inhibidor de la enzima ALS precursora de la síntesis de aminoácidos esenciales como alanina, valina e isoleucina, interrumpiendo así el crecimiento de las malezas.



Improsate GOLD

Sal Dimetilamina de Glifosato 608 g/L

WEEDKILL

2,4 DB Ester Isobutilico 930 g/L



CLOPYRALEX

Sal Monoetanolamina de Clopiralid 480 g/L

	Cultivo o sitio de aplicación	Maleza		Dosis	Momentos
_		Nombre común	Nombre científico	(g/ha)	Momentos de aplicación
Т	ALFALFA (Medicago sativa)			60 - 90	
Α	TRÉBOL ROJO (Trifoluim pratense) LOTUS				
В	(Lotus spp.) RAIGRASS (Lolium multiflorum) AVENA				
L	(Avena sativa) FESTUCA (Festuca arundinacea) CEBADILLA	Nabo	Raphanus raphanistrum		Pre emergencia de la pastura.
Α	(Bromus spp) TRIGO (Triticum aestivum)	Mostacilla Manzanilla	Rapistrum rugosum Anthemis cotula	60 - 70	
	FALARIS (Phalaris arundinacea)	Sanguinaria	Polygonum aviculare		
D	TRÉBOL BLANCO (Trifolium repens)	Viznaga	Ammi visnaga		
E U S	ALFALFA (Medicago sativa) TRÉBOL ROJO (Trifoluim pratense) LOTUS (Lotus spp.) RAIGRASS (Lolium multiflorum) AVENA	Yerba carnicera	Conyza bonariensis	40 - 50	Post emergencia temprana de pastura.
0 S	(Avena sativa) FESTUCA (Festuca arundinacea) CEBADILLA (Bromus spp) TRIGO (Triticum aestivum) FALARIS (Phalaris arundinacea			50 - 60	Post emergencia tardía de pasturas (+ de 1 año)

Tiempo de espera:

Se debe esperar 15 días entre la aplicación y el pastoreo o corte.

Información complementaria:

- Para un control más eficaz el suelo debe tener un buen nivel de humedad. En caso contrario se podrían observar nuevas emergencias que serán controladas una vez reestablecido el nivel de humedad en el suelo.
- Compatible con Improsate Gold (glifosato) en pre emergencia y con WeedKill (2.4DB), MCPA y Clopyralex (clopyralid) para ampliar su espectro de control en post emergencia. Compatible con Galaxyfop PLUS (haloxifop-metyl) para control gramíneas en semilleros. Compatible con insecticidas Clorpirifos Tafirel y Rapidex 240 (metoxyfenocide).

Ruta Nacional 101, km 24,500, Canelones Uruguay. Tel.: 598 2 683 8815 www.tafirel.com



TAFIREL

