

Pyclorex

Herbicida - Concentrado soluble

Ficha Técnica



Características:

Herbicida sistémico, de acción hormonal. Controla malezas de hoja ancha, anuales y perennes. Tiene acción hormonal y es selectivo para trigo, cebada, maíz, sorgo, pasturas gramíneas y campo natural. Es absorbido por el follaje, tallo y raíces de las malezas.

Ventajas:

- Excelente selectividad.
- Amplio espectro de acción.
- Herramienta muy útil en barbechos largos con destino a soja.

Pyclorex

Herbicida - Concentrado soluble

Principio activo: Picloram, Sal Potásica 280 g/L
Equivalente en ácido picloram 240g/L
Formulación: Concentrado soluble
Grupo químico: Derivado del ácido piridiloxiacético

Modo de acción:

El herbicida es absorbido principalmente por hojas y se transloca a los puntos de crecimiento. Posee acción hormonal, sustituyendo a la auxina, provocando así un desequilibrio en la planta lo que genera un enrollamiento de sus hojas y luego su muerte.

Tiempo de espera:

Se deben esperar 21 días entre aplicación y cosecha.

T A B L A D E U S O S	Cultivo o sitio de aplicación	Malezas		Dosis	Momento de aplicación en el cultivo
		Nombre común	Nombre científico		
	TRIGO (Triticum aestivum L.)	Biznaga	Ammi viznaga	75 - 100 cc/ha	Aplicar cuando los cereales no tengan menos de 3-5 hojas
	CEBADA (Hordeum vulgare L.)	Sanguinaria	Polygonum aviculare		
	RAIGRÁS (Lolium multiflorum L.)	Enredadera	Polygonum convolvulus		
	FESTUCA (Festuca arundinacea)	Cardo ruso	Cardus nutans		
		Cardo negro	Cirsium vulgare		
		Mostacilla	Rapistrum rugosum	100 - 125 cc/ha	Aplicar en cobertura: Maíz: desde 2 a 8 hojas. Sorgo: desde 4 a 8 hojas. En cultivos con más de 8 hojas se puede realizar aplicación dirigida con caños de bajada. Se puede mezclar con 2,4 D para aumentar el espectro de control.
	MAÍZ (Zea Mays L.)	Rábano	Raphanus raphanistrum		
		Flor morada	Echium plantagineum		
	SORGO (Sorghum bicolor (L.) Moench)	Abrojo	Xanthium cavanillesii		
		Cepa caballo	Xanthium spinosum		
		Yerba carnícera	Conyza bonariensis	80 - 120 cc/ha	Mezclar con Glifosato. Considerar el intervalo entre aplicación y la siembra de cultivos susceptibles.
		Lengua de vaca	Rumex crispus		
	BARBECHO	Senecio	Senecio madascariensis		
		Quinoa	Chenopodium album		

Productos recomendados:

WEEDEx^{max}

Sal Dimetilamina del 2,4-D 720 g/L



Aminopyralax

Sal potásica de aminopyralid 88,8%

WEEDKILL

2,4 DB Ester isobutilico 930 g/L

FLUROXYPYR TAFIREL

Fluroxypyr-meptyl 480 g/L



Información extra:

- Se podrán sembrar Soja y otras leguminosas susceptibles luego de transcurridos más de 90 días desde que fue aplicado el producto.
- Para control de malezas crucíferas, se recomienda su mezcla con Weedex Max.
- En caso de utilizar mezclas con 2,4-D o MCPA, agregar primero al tanque de la pulverizadora Pyclorex y luego incorporar 2,4-D o MCPA con los agitadores de la pulverizadora encendidos.



Ruta Nacional 101, km 24,500,
Canelones Uruguay.
Tel.: 598 2 683 8815
www.tafirel.com



TAFIREL

Descargá nuestro catálogo

