



FICHA TÉCNICA

HERBICIDA



CARACTERÍSTICAS:

TACIT BVD controla malezas de hoja ancha con la tecnología DROPGRIP[®], posee acción sistémica, y es de rápida acción ya que se observan los síntomas en la maleza 24hs posterior a su uso. No presenta riesgo de deriva y volatilidad.

VENTAJAS:

- ✓ EVITA LOS PROBLEMAS DE DERIVA.
- ✓ NO PRESENTA RIESGO DE VOLATILIDAD.
- ✓ MENOR OLOR QUE OTRAS SALES DE 2,4 D.
- ✓ EXCELENTE SISTEMIA.





PRINCIPIO ACTIVO: 2,4 D SAL COLINA 669 g/L
FORMULACIÓN: CONCENTRADO SOLUBLE
GRUPO QUÍMICO: FENOXIACETICO

MOMENTO DE APLICACIÓN:

Barbecho: Cuando las malezas esten en activo crecimiento y un tamaño menor a 10cm. Se debe dejar transcurrir al menos 15 días entre la aplicación de Tacit BVD y la siembra de cultivos sensibles.

Trigo: Desde la 2da a 3era hoja hasta final del macollaje.

Cebada, Centeno y avena: Desde el inicio al fin de macollaje (Z21 a Z30).

Maíz y sorgo: Desde la 2° hoja hasta la 8° hoja del cultivo aplicar en cobertura total. Desde la 8° hoja aplicar con caños de bajada.

Soja tolerante a 2,4D: Aplicar pre siembra o pre emergencia del cultivo (V0), realizando un máximo de 2 aplicaciones.

TIEMPOS DE ESPERA:

15 días entre siembra y aplicación en cultivos sensibles.

MODO DE ACCIÓN:

TACIT BVD® presenta acción sistémica, absorbiéndose por las hojas y las raíces translocándose a toda la planta, generando una inhibición en la elongación celular.

INFORMACIÓN EXTRA:

Puede aplicarse junto con Glifosato sal dimetilamina - Improsate gold.

Es compatible con los productos utilizados normalmente en post-emergencia de soja y maíz.

CONCLUSIONES DE ENSAYO:

En las condiciones de evaluación el testigo comercial y Tacit BVD lograron controles similares al testigo comercial. Obteniendo niveles de 100% de control a partir de 25 días de la aplicación.

Se observó fitotoxicidad inicial de 2,6-2,9 según escala EWRS (Síntoma muy ligero con el producto en evaluación TACIT BVD (2 y 3,5 lts/ha) y con el testigo comercial (2 lts/ha).

CUADRO DE USOS

Cultivos	Nombre de Malezas		Dosis (L/ha)
	Nombre común	Nombre científico	
BARBECHO	Abrepuño	Centaurea calcitrapa	1.5 - 2.5 + Glifosato i.a. 960 g/ha** corrector**
	Abrojo grande	Xanthium cavanillesii	
TRIGO (Triticum aestivum L.)	Biznaga	Ammi visnaga	0.75 - 1
	Biznaguilla	Ammi majus	
CEBADA (Hordeum vulgare L.)	Cardo negro	Cirsium vulgare	0.42 - 0.55 + (sal DGA de dicamba i.a. 48% de baja volatilidad) 0.1 - 0.15
	Cardo ruso	Cardus nutans	
CENTENO (Secale cereale L.)	Cepa caballo	Xanthium spinosum	Maíz 0.7 - 0.84 Sorgo 0.42 - 0.6 + (sal DGA de dicamba i.a. 48% de baja volatilidad) 0.05-0.200
	Chinchilla	Tagetes minuta	
AVENA (Avena sativa L.)	Diente de león	Taraxacum officinalis	1.5 - 2.5 + Glifosato i.a. 960 g/ha (****) corrector(****)
	Lengua de vaca	Rumex crispus	
MAÍZ (Zea mays L.)	Mostacilla	Rapistrum rugosum	
	Nabo silvestre	Brassica campestris	
SORGO (Sorghum bicolor (L.) Moench.)	Quinoa	Chenopodium album	
	Rábano	Raphanus raphanistrum	
SOJA TOLERANTE A 2,4-D (Glycine max L.)	Oreja de ratón	Dichondra repens	
	Verdolaga	Portulaca oleracea	
	Yerba carnícera	Conyza bonaerensis	
	Yerba carnícera	Conyza sumatriense	
	Yuyo colorado	Amaranthus quitensis	
	Yuyo colorado	Amaranthus palmeri	

(**) Sojas conteniendo el evento DAS-44406-6, solo o apilado con otros eventos, el cual otorga tolerancia a 2,4-D, glifosato y glufosinato de amonio. (*) Mezclas con glifosato: utilizar en mezcla con glifosatos a base de sal dimetilamina preferentemente. (**)Es recomendable usar un Corrector de pH y secuestrante de cationes (aguas duras)

INFORMACIÓN DE ENSAYO

PRUEBA DE EFICACIA DE TACIT BVD EN CONTROL DE Amaranthus spp. (Yuyo colorado) en zafra 2024-2025. Ubicación: Ruta 21 km 320, La Concordia, Departamento de Soriano. **Variedad:** DM 60E60 **Diseño:** Parcelas al azar con tres repeticiones, cada parcela de 30 m² (3 x 10 m). **Equipo:** Máquina costal a motor equipada con válvula de presión constante, regulada a dos atmósferas y gasto de agua de 120 L/ha. **Cuadro de información de ensayo**

PRODUCTOS USADOS

Testigo comercial	2,4 D Sal colina 669g/L
Tacit BVD	2,4 D Sal colina 669g/L

Detalles del ensayo.

Porcentaje de fitotoxicidad en soja Enlist DM 60E60, según escala EWRS. (Soriano 2024-2025).

Control (%)		24/11/24	30/11/24	9/12/24	17/12/24
1	TESTIGO	0	0	0	0
2	Testigo comercial (2L/ha)	1,8 b	2,6 b	0	0
3	Tacit BVD (2L/ha)	1,9 b	2,6 b	0	0
4	Tacit BVD (3,5L/ha)	2 b	2,9 b	0	0
	CV%	54,4	20	s/a	s/a

Medida seguidas por distinta letra difieren estadísticamente al 5%.

Porcentaje de control de Amaranthus spp en soja Enlist DM60E60, para los distintos tratamientos, en diferentes fechas de muestreo.

Control (%)		24/11/24	30/11/24	9/12/24	17/12/24
1	Testigo absoluto	0	0	0	0
2	Testigo comercial (2L/ha)	62,5 b	83,1 b	99,4 b	100
3	Tacit BVD (2L/ha)	61,9 b	83,8 b	98,8 b	100
4	Tacit BVD (3,5L/ha)	66,3 c	97,5 c	100 b	100
	CV%	6,7	3,9	2	s/a

Medida seguidas por distinta letra difieren estadísticamente al 5%.

